4° Bavar. 1617(1

8° Bavar. 1614 g

FVNGORVM
BAVARIAE ET PALATINATVS
ICONES
CIRCA
RATISBONAM.

Natürlich ausgemahlte
Abbildungen
Bayrischer und Pfälzischer
Schwämme
um
Regensburg.

R

26 Bg



J. J. Preisler del. G. P. Trautner sc. Norimb.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFER
PHILOSOPHIAE DOCT. ET ECCLESIAE EVANGELICAE RATISBON. MINISTRI
SERENISS. AC POTENTISS. REGIS DANIAE NORVVEGIAE A CONSILIIS
GYMNASII ACADEMICI ALTON. PROFESSORIS HONORARII
ACADEM. NATVR. CVRIOS. BEROLIN. ROBORET. ET MONACENS.
SOCIET. LITTER. DVISBVRG. TEVTON. GOETTING. ET LIB. ART. LIPS. SOCII
ACADEMIAE PARISIENS. AB EPISTOLARVM COMMERCIO

FVNGORVM

QVI IN

BAVARIA ET PALATINATV

CIRCA

RATISBONAM

NASCVNTVR

ICONES

NATIVIS COLORIBVS EXPRESSAE.

TOMVS PRIMVS.

AVSPICIIS
ACADEMIAE ELECTORALIS BAVARICAE MONACENSIS.

RATISBONAE, TYPIS ZVNKELIANIS.
MDCCLXII.

Schaeffer
Abbildungen
Bayrisch.- u. Pfälz.
schwämme
1

26 B g braun mit Schild

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Jacob Christian Schäffers,
Der Weltweisheit Doctors und Evangel. Predigers zu Regensburg,
Sr Königl. Maj. zu Dännemark Norwegen Rathes und ausserordentl. Lehrers auf dem Gymnas. Academ. zu Altona,
der Academie der Naturforscher, zu Berlin, Roveredo und München,
der Gesellschaft der Wissenschaften zu Duisburg, und deutschen Gesellschaft zu Göttingen und Leipzig Mitgliedes,
und der Academie zu Paris Correspondentens,

natürlich ausgemahlte

Abbildungen Bayrischer und Pfälzischer Schwämme,

welche
um Regensburg
wachsen.

Erster Band.

Auf Veranlassung
der Churfürstl. Bayrischen Academie der Wissenschaften zu München.

Regensburg, gedruckt mit Zunkelischen Schriften.
1762.

SERENISSIMO ET POTENTISSIMO

PRINCIPI AC DOMINO,

DOMINO

MAXIMILIANO IOSEPHO,

VTRIVSQVE BAVARIAE ET SVPERIORIS PALATINATVS DVCI, COMITI PALATINO RHENI, S. R. I. ARCHIDAPIFERO ET ELECTORI, LANDGRAVIO LEVCHTENBERGENSI CET. CET.

DOMINO MEO CLEMENTISSIMO;

NEC NON

SERENISSIMO ET POTENTISSIMO

PRINCIPI ET DOMINO,

DOMINO

CAROLO THEODORO,

COMITI PALATINO RHENI, S. R. I. ARCHITHESAVRARIO ET ELECTORI, BAVARIAE, IVLIAE, CLIVIAE ET MONTIVM DVCI, PRINCIPI MOERSAE, MARCHIONI BERGOPZOMII, VELDENTIAE, SPONHEMII, MARCHIAE ET RAVENSBERGII COMITI, DOMINO RAVENSTEINII

CET. CET.

DOMINO MEO CLEMENTISSIMO.

SERENISSIMI AC POTENTISSIMI PRINCIPES ELECTORES, PRINCIPES AC DOMINI CLEMENTISSIMI!

Auſus ſum primam partem iconum eorum fungorum, qui in tractibus ditionis VESTRAE, huic vrbi vicinis, prouenire ſolent, ad pedes VESTROS, qua fas eſt animi ſubmiſſione, deponere.

Maximam hanc eſſe temeritatem plurimi fortaſſe iudicabunt, neque ipſe diffiteor: verum longe maiorem eſſe VESTRAM, PRINCIPES ELECTORES SERENISSIMI, gratiam atque clementiam in homines, qui ſe litteris dederunt, quis eſt, qui ignoret? Omnes admirabundi venerantur incredibile illud ac plane diuinum ſtudium, quo rempublicam litterariam ſtabilire, tueri, amplificare atque ornare ſine fine modoque contenditis. Non ſatis eſt excelſiſſimis animis VESTRIS, PRINCIPES ELECTORES SERENISSIMI, a regionibus & populis ſub ſapientiſſimo ac mitiſſimo imperio VESTRO florentibus caliginoſam praeiudicatarum opinionum noctem propulſare, iucundamque ſolidae ac fructuoſae ſcientiae lucem magis magisque diffundere: verum etiam exteros muſarum cultores proſequitur gratia & munificentia VESTRA, eorumque mirifice acuit atque excitat induſtriam. Quantus hic mihi aperitur campus, in quo poſſit oratio mea excurrere, ſi ea

dicendi

dicendi instructus essem facultate, quae, non dicam exornandis, sed enarrandis virtutibus VESTRIS sufficiat! Posteri certe, incorruptissimi principum virorum iudices, numquam intermorituras laudes VESTRAS celebrabunt, atque ad omnium saeculorum memoriam propagabunt: inque tabulis aeternitatis MAXIMILIANVS IOSEPHVS & CAROLVS THEODORVS auspicatissima nomina, inter eos principes fulgebunt, qui Supremi Numinis vice in his terris functi sunt sanctissime.

Equidem ad solium diuinae omnipotentiae supplex prostratus VOBIS, PRINCIPES ELECTORES SERENISSIMI, perpetuam atque omnibus numeris absolutam exoro prosperitatem. Annuat DEVS semper & faueat sapientissimis VESTRIS consiliis, ac SERENISSIMAS DOMOS BAVARICAM & PALATINAM omni rerum expetendarum affluentes copia seruet, sospitet, foueat vsque ad finem saeculorum!

SERENISSIMI AC POTENTISSIMI
PRINCIPES ELECTORES,
PRINCIPES AC DOMINI CLEMENTISSIMI,

SERENITATIBVS VESTRIS

Subiectissimus ac deuotissimus

IACOBVS CHRISTIANVS SCHAEFFER
Saxo-Querfurthensis.

Dem

Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn,

HERRN

Maximilian Joseph,

In Ober- und Niederbayern, auch der Ober-Pfalz
Herzoge, Pfalzgrafen bey Rhein, des H. R. R. Erztruchsessen
und Churfürsten, Landgrafen zu Leuchtenberg,
u. s. w.

Meinem gnädigsten Churfürsten und Herrn;

Wie auch

Dem

Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn,

HERRN

Carl Theodor,

Pfalzgrafen bey Rhein, des Heil. R. R. Erzschatzmeistern und Churfürsten, Herzoge in Bayern, zu Jülich, Cleve und Berg, Fürsten zu Mörß, Marggrafen zu Bergopzoom, Grafen zu Veldenz, Sponheim, der Mark und Ravensberg, Herrn zu Ravenstein,
u. s. w.

Meinem gnädigsten Churfürsten und Herrn!

Durchlauchtigſte Churfürſten,
Gnädigſte Churfürſten und Herren!

Euren Churfürſtlichen Durchlauchten erkühne ich mich, den erſten Theil meiner herausgegebenen Abbildungen ſolcher Schwämme, welche um hieſige Stadt in Höchſtdero Ländern wachſen, in tiefſter Unterthänigkeit zu Füſſen zu legen.

Dieſe Kühnheit, ich geſtehe es, iſt ſehr groß; allein die Huld und Gnade Ew. Ew. Churfürſtl. Churfürſtl. Durchl. Durchl. gegen diejenigen, welche ſich den Wiſſenſchaften gewidmet haben, iſt noch gröſſer.

Jedermann verehret und bewundert den großmuthsvollen Eifer, womit Höchſtdieſelben, das Reich der Gelehrſamkeit zu beveſtigen, zu beſchützen, zu erweitern, und zu verherrlichen unaufhörlich bemühet ſind. Ew. Ew. Churfürſtl. Churfürſtl. Durchl. Durchl. erhabenſten Seelen iſt es nicht genug, von Höchſtdero eigenen Staaten die Nacht der Vorurtheile zu entfernen, und in denſelben das Licht gründlicher und fruchtbarer Wiſſenſchaften weiter auszubreiten; Ew. Ew. Churfürſtl. Churfürſtl. Durchl. Durchl. ermunternde

und

und belohnende Gnade erstrecket sich auch auf auswärtige Freunde der Musen. Wie vieles könnte ich anführen, wenn meine Kräfte hinreichten, mich als einen Lobredner Ew. Ew. Churfürstl. Churfürstl. Durchl. Durchl. darzustellen! Die unpartheyische Richterin der Großen dieser Erde, die Nachwelt, diese wird noch in den spätesten Zeiten Höchstdero Ruhm verkündigen. Und die Namen Maximilian Joseph und Carl Theodor werden in dem Buche der Ewigkeit bey denen Regenten prangen, welche würdige Statthalter des Höchsten gewesen sind.

Ich werfe mich vor dem Throne der göttlichen Allmacht nieder, um Ew. Ew. Churfürstl. Churfürstl. Durchl. Durchl. die allervollkommenste Glückseligkeit zu erbitten. Der HERR beglücke Ew. Ew. Churfürstl. Churfürstl. Durchl. Durchl. preißwürdigste Unternehmungen, und lasse die Durchlauchtigsten Chur-Häuser Bayern und Pfalz bis an das Ende der Tage ein immerwährender Gegenstand seines Seegens seyn!

Durchlauchtigste Churfürsten,
Gnädigste Churfürsten und Herren,
Ew. Ew. Churfürstl. Churfürstl. Durchl. Durchl.

unterthänigst gehorsamster
Jacob Christian Schäffer.

SALVTEM LECTORI.

Maximam omnino percipio voluptatem, quum primum tomum *iconum fungorum* BAVARIAE ET PALATINATVS, *natiuis coloribus* expreſſarum, rei herbariae ſtudioſis offerre, & quaſi in manus tradere, mihi contingat.

Et poſteaquam amici quidam non obſcure mihi ſignificarunt deſiderium, alii etiam apertius mecum egerunt, vt curarem, ne opus hoc, & mole, & ſumtu, nimium excreſceret; huic, quod iam in publicum prodit, volumini non niſi vnicum ſuccedet.

Sicuti hoc *agaricos,* quod genus fungorum multo numeroſiſſimum eſt, in ſe continet; ita alterum reliqua complectetur genera; ſperoque fore, vt anni futuri medio totum opus abſoluatur.

Cetera, quae de hoc opere monenda, aut vberius exponenda, eſſe videantur; alterius partis praefationi reſeruare ſatius duco. Ratisbonae, Calend. Sept.

A. C. CIↃ IↃ CC LXII.

Vorerinnerung.

Mit dem innigsten Vergnügen liefere ich den Freunden der Kräuterkunde den ersten Band der natürlich ausgemahlten **Abbildungen Bayrischer und Pfälzischer Schwämme** hiermit in die Hände.

Und da verschiedene Freunde zu erkennen gegeben, und zum Theile ganz eigentlich mich darum ersuchet haben, die- dieses Werk nicht allzustark, und mithin nicht allzukostbar, zu machen; so soll diesem gegenwärtigen Bande nicht mehr, als noch einer, folgen.

Gleichwie der itzige die **Blätterschwämme**, als das stärkste Schwammgeschlechte, enthält; also wird der künftige die übrigen Geschlechter in sich fassen; und ich hoffe, in der Mitte des künftigen Jahres das Werk beschliessen zu können.

Was wegen dieser Ausgabe sonst noch einer Erinnerung, oder Erläuterung, bedürfen mögte, werde ich in der künftigen Vorrede des zweyten Bandes beyzubringen nicht ermangeln. Regensburg, den 1. Sept. 1762.

GENVS PRIMVM.

AGARICI.

Erstes Geschlechte.

Blätterschwämme.

AGARICVS PRIMVS.

Eſt fungus bicolor, tam ceſpitoſus, quam ſimplex, aliquantulum carnoſus, intrinſecus cauus, parumque mutabilis; petiolo ad baſin craſſiuſculo & tenuiter ſquamoſo; velo, araneum referente, & annulo perpetuo, praeditus. Proprio apud *Bauaros* nomine deſtituitur.


Fig. I. Faſciculus fungorum; aetatis, formae & euolutionis diuerſae.
Fig. II. Fungus euolutus, cuius ſuperficies inferior maxime eſt conſpicua.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Fungus euolutus, pileo valde conuexo.
Fig. V. Fungus euolutus, pileo faſtigiato.
Fig. VI. Fungus nondum euolutus, cum velo araneum referente.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. VIII. Pollen lente auctus.

Erklärung der erſten Kupfertafel.

Der erſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſowohl ein- als vielfacher, etwas fleiſchiger, innwendig hohler, und wenig veränderlicher Schwamm; mit einem etwas knolligen und zartſchuppigen Stiele, einer ſpinnewebigen Saamendecke, und einem beſtändigen Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig I. Ein Büſchel dieſer Schwämme; von verſchiedenem Alter, verſchiedener Geſtalt und Entwickelung.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, wo die untere Saamenfläche ſonderlich ſichtbar iſt.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit gewölbtem Hute.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, mit zugeſpitztem Hute.
Fig. VI. Ein unentwickelter Schwamm, mit ſeiner ſpinnewebigen Saamendecke.
Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VIII. Der vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. I.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
S. Loibel p. Rat.
G. P. Trautner sculps. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SECVNDAE.

AGARICVS SECVNDVS.

Eſt fungus bicolor, raro ceſpitoſus, nulla ferme carne, intrinſecus fiſtuloſus; pileo nunc faſtigiato, nunc convexo; petiolo ſubtiliter ſtriato, & non raro tortili; ſine velo & annulo. Nomen eius in *Bauaria* eſt nullum.


Fig. I. Par fungorum paruorum.
Fig. II. Fungus ſe euoluens, pileo faſtigiato.
Fig. III. Fungus euolutus.
Fig. IV. Fungus euolutus, cuius facies inferior maxime conſpicua eſt.
Fig. V. Fungus nondum euolutus.
Fig. VI. Par fungorum, vti caelo admodum pluuio mutantur.
Fig. VII. Fungus euolutus, pileo fiſſo.
Fig. VIII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IX. Fungus, cum deſtruitur, totus nigreſcens.
Fig. X. Pollen natiuus.
Fig. XI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyten Kupfertafel.

Der zweyte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, insgemein einfacher, faſt gar nicht fleiſchiger, innwendig hohler Schwamm; mit theils zugeſpitztem, theils gewölbtem, Hute; mit einem zart geſtrichelten, und nicht ſelten gewundenen, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar kleine Schwämme.
Fig. II. Ein ſich entwickelender Schwamm, mit zugeſpitztem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, an welchem die untere Saamenfläche ſonderlich zu ſehen iſt.
Fig. V. Ein unentwickelter Schwamm.
Fig. VI. Ein Paar Schwämme, wie ſie bey naſſem Wetter ſich verfärben.
Fig. VII. Ein entwickelter Schwamm, mit zerſpaltenem Hute.
Fig. VIII Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IX. Ein Schwamm, wie er beym Vergehen völlig ſchwarz wird.
Fig. X. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. XI. Der vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. II.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. X.
Fig. XI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sculps. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE TERTIAE.

AGARICVS TERTIVS.

Est fungus, prout lux in superficiem inferiorem incidit, modo vnicolor, modo bicolor, modo tricolor; semper fere simplex, carnosus, &, si colorem excipias, parum mutabilis; pileo punctis, vel granulis, adsperso; petiolo tuberoso & subtiliter striato; velo areneum referente, sed nullo annulo. Nomine proprio apud *Bauaros* caret.

Fig. I. Fungus vnicolor, nondum euolutus, cum velo aranei simili.

Fig. II. Fungus euolutus; pileo saturatioris coloris, pluribus punctis sparso, & fere granulato; sed petiolo dilutioris coloris.

Fig. III. Fungus inuersus, tricolor, in quo maxime cognoscere licet superficiei inferioris colorem, quem ducit, varium, seu heluolum.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus, carne in primis adparente.

Fig. V. VI. Par fungorum vnicolorum, quorum pilei & petioli punctis subtiliter sunt conspersi, sed figura differunt.

Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der dritten Kupfertafel.

Der dritte Blätterschwamm.

Es ist solcher, nach dem das Licht auf seine Unterfläche fället, ein bald ein- bald zwey- bald dreyfärbiger; fast allezeit einfacher, fleischiger, und, außer der Farbe, wenig veränderlicher Schwam̃; mit einem gedippelten Hute, einem knolligen und zart gestrichelten Stiele, einer spinnenwebigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein einfacher unentwickelter Schwamm, mit seiner spinnewebigen Saamendecke.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, mit dunkelfärbigem, stark gedippeltem und fast knopperigem, Hute, aber hellfärbigem Stiele.

Fig. III. Ein umgekehrter dreyfärbiger Schwamm, an welchem die Schielerfarbe der Unterfläche sonderlich zu erkennen ist.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm, wo vornämlich sein fleischiges Wesen sichtbar ist.

Fig. V. VI. Ein Paar einfärbige Schwämme, mit zart gedippelten, der Gestalt nach aber verschiedenen, Hüten und Stielen.

Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.


Tab. III.
Fig. VII.
Fig. II.
Fig. VIII.
Fig. I.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. VI.
Fig. V.
St. Loibel pinx. Ratisb.

EXPLICATIO TABVLAE QVARTAE.

AGARICVS QVARTVS.

Est fungus fere vnicolor, tam ſimplex, quam ceſpitoſus, intrinſecus cauus, parum carnoſus, parumque mutabilis; pileo nunc conuexo, nunc faſtigiato; petiolo varie inflexo; velo araneum referente, ſed ſine annulo. Proprium in *Bauaria* nomen non habet.


Fig. I. Faſciculus horum fungorum; magnitudinis, formae & euolutionis diuerſae. Fig. II. Fungulus nondum euolutus, cum velo aranei ſimili, & pileo faſtigiato. Fig. III. Fungus aliquatenus euolutus, pileo obtuſe faſtigiato, & petiolo dupliciter inflexo. Fig. IV. Fungus, qui coelo pluuio plurimum humoris imbibit, fiſſus & flori ſimilis. Fig. V. VI. Funguli pileis conuexis, paene globoſis. Fig. VII. Fungus euolutus oblique ſitus, & petiolo oblique truncatus. Fig. VIII. Fungus fere euolutus, pileo nonnihil acuminato & petiolo aliquantulum flexo. Fig. IX. Fungus ad perpendiculum diſſectus. Fig. X. Fungus euolutus pileo fere conuexo, & petiolo recto. Fig. XI. XII. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der vierten Kupfertafel.

Der vierte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein faſt einfärbiger, ſowohl ein= als vielfacher, inwendig hohler, wenig fleiſchiger und wenig veränderlicher Schwamm; mit einem gewölbten, oder zugeſpitzten, Hute; einem gebogenen Stiele; einer ſpinnewebigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel dieſer Schwämme, von verſchiedener Größe, Geſtalt und Entwickelung. Fig. II. Ein unentwickeltes Schwämmgen, mit ſeiner ſpinnewebigen Saamendecke und zugeſpitztem Hute. Fig. III. Ein etwas entwickelter Schwamm, mit rundzugeſpitztem Hute, und einem ſchlangenförmigen Stiele. Fig. IV. Ein, bey naſſem Wetter, ſtark angeſaugter, zerſpaltener und blumenähnlicher Schwamm. Fig. V. VI. Ein Paar Schwämmgen, mit gewölbtem, und faſt kugelrundem, Hute. Fig. VII. Ein ſchrägliegender, und am Stiele ſchief abgeſchnittener, entwickelter Schwamm. Fig. VIII. Ein meiſt entwickelter Schwamm, mit ſchwach zugeſpitztem Hute. Fig. IX. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm. Fig. X. Ein entwickelter Schwam̃, mit gewölbtem Hute und faſt geradem Stiele. Fig. XI. XII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. IV.
Fig. X.
Fig. IX.
Fig. VIII.
Fig. XII.
Fig. VII.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. I.
Fig. XI.
Fig. IV.
Fig. III.
Fig. II.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G.P. Nußbiegel sculps. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINTAE.

AGARICVS QUINTVS.

Eſt fungus optime eſculentus, bicolor, interdum tricolor, plerumque ſolitarius, carnoſus, totus lacteus, mutabilis; petiolo ad baſin craſſiuſculo, velo & annulo carens. *Bauaris* dicitur *Braedling*.

Fig. I. Par fungorum euolutorum, quorum minor pileo, in vertice papillato, donatus eſt.

Fig. II. Fungus dimidia parte euolutus, cuius pro velo limbus marginis conſpicitur adhuc introrſus conuolutus, cuiusque petiolo duo funguli inſident.

Fig. III. Fungus pileo ſurſum erecto, euolutus, qui, dum acu pungitur, lacteum ſuccum globulis, lacrimulas imitantibus, exſudat *a*.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus, pileo in centro profundius depreſſo.

Fig. V. Fungus pileo infundibulum imitante & inaequali.

Fig. VI. VII. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der fünften Kupfertafel.

Der fünfte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein vor andern eßbarer, zwey- oder auch dreyfärbiger, insgemein einzelner, fleiſchiger, und veränderlicher, Milchſchwam̄; mit dicklich auslaufendem Stiele, ohne Saamendecke und ohne Ring. Iſt in Bayern unter dem Namen Brädling bekannt.

Fig. I. Ein Paar entwickelte Schwämme, davon der kleinere einen, in der Mitte warzenförmigen, Hut träget.


Fig. II. Ein halb entwickelter Schwamm, an welchem, ſtatt einer Saamendecke, die einwärts zuſammengerollte Randeinfaſſung zu ſehen iſt, und deſſen Stiele noch ein Paar andere Schwämmingen anſitzen.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm mit aufwärts gerichtetem Hute, und wie, beym Ritzen oder Schneiden, der Milchſaft in runden Kügelgen thränenartig hervordringet.

Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener, im Mittelpunkte des Hutes vertiefter, Schwamm.

Fig. V. Ein Schwamm mit trichterförmigem und ungleichem Hute.

Fig. VI. VII. Der vergrößerte und natürliche Saamenſtaub.



St. Loibel pinx. Ratisb. G. L. sculps. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEXTAE.

AGARICVS SEXTVS.

Eſt fungus hydrophorus, tricolor, ceſpitoſus, vix carnoſus, intrinſecus cauus, admodum mutabilis; ſine velo & annulo. In *Bauaria* proprio nomine caret.

Fig. I. Faſciculus fungorum, aetatis, euolutionis & formae diuerſae.

Fig. II. Faſciculus fungorum perquam exiguorum.

Fig. III. Fungus, deficiente neceſſario humore, marceſcere incipiens.

Fig. IV. Fungus, qui dum euoluitur, pollinem emittit, & chartam ſubiectam nigrore opplet.

Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VI. Fungus nimia ſiccitate ruptus & marcidus.

Fig. VII. Pollen natiuus.

Fig. VIII, IX. Pollen lente auctus.

Erklärung der ſechſten Kupfertafel.

Der ſechste Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein dreyfärbiger, vielfacher, faſt gar nicht fleiſchiger, innwendig hohler, und ſehr veränderlicher Waſſerſchwamm; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel dieſer Schwämme, von verſchiedenem Alter, verſchiedener Entwickelung und Geſtalt.

Fig. II. Ein Büſchel dieſer Schwämme von ſehr kleiner Art.

Fig. III. Ein Schwamm, welcher aus Mangel nöthiger Feuchtigkeit zu verwelken anfänget.


Fig. IV. Ein Schwamm, welcher während ſeiner Entwickelung den Saamenſtaub fallen läſſet, und damit das unterliegende Pappier ganz ſchwarz überziehet.

Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VI. Ein von allzugroßer Dürre zerriſſener und verwelkter Schwamm.

Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. VIII, IX. Der vergrößerte Saamenſtaub.



Soph: Beezin pinx. Ratisb. Ioh. Matth. Fridrich sculps. Ratisbon.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTIMAE.

AGARICVS SEPTIMVS.

Est fungus hydrophorus, bicolor, villoso-squamosus, so-
litarius, praeter radicem petioli non carnosus, intrinsecus
cauus; pileo ab initio ouato, post conico, tandem vel
campanulato, vel plano; petiolo radice, vel tuberosa,
vel flexa & rostrata, donato; annulo plerumque persi-
stente, sed sine velo. Nomen apud *Bauaros* habet nullum.

Fig. I. Fungus nondum explicatus, pileo ouato. Fig. II. Fungus
nondum euolutus, ad perpendiculum dissectus. Fig. III. La-
mellae aliquot pilei, quarum color albidus in atrum mutari in-
cipit. Fig. IV. Fungus euolutus, tertia iam parte resolutus;
annulo persistente. Fig. V. Fungus euolutus, cuius pileus
in atramentum, guttatim defluens, resoluitur; petiolo persistente.
Fig. VI. Fungus euolutus, cuius facies inferior se maxime ex-
hibet. Fig. VII. Petiolus oblique dissectus, vbi *a* fili capitu-
lum, cuius ope pileus cum petiolo connectitur, indicat. Fig. VIII.
Pollen natiuus liquamini immersus. Fig. IX. X. Pollen auctus.

Erklärung der siebenden Kupfertafel.

Der siebende Blätterschwamm

Es ist solcher ein zweyfärbiger, zottenschuppiger, einzelner, außer der
Wurzel des Stieles gar nicht fleischiger, iñwendig hohler Wasser-
oder Mistschwam̃; mit einem anfangs eyförmigen, alsdenn kegel-
artigen, und endlich entweder glockenähnlichen, oder flachen Hute;
mit einem Stiele, dessen Wurzel entweder knollig, oder gebogen ist,
und in einen Schnabel au⁼läuft; mit einem meistens beständigen
Ringe, aber ohne Saamendecke. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I Ein unentwickelter Schwamm, mit eyförmigem Hute. Fig. II. Ein
unentwickelter Schwamm, senkrecht zerschnitten. Fig III Einige Saa-
menblätter des Hut∙s, wie deren weißliche Farbe schwärzlich zu werden
anfänget. Fig· IV. Ein entwickelter und, dem dritten Theile nach, schon
verweseter Schwamm, mit einem beständigen Ringe. Fig. V. Ein ent-
wickelter Schwamm, wie dessen Hut sich in eine Art von Dinte auflöset, und
tropfenweise abtripfet; der Stiel aber unverändert bleibet. Fig. VI. Ein
entwickelter Schwamm, wie dessen Unterfläche sich zeiget. Fig. VII. Ein
schief durchschnittener Stiel, wo der Buchstabe *a* das Köpfgen desjenigen
Faden andeutet, vermöge dessen der Hut mit dem Stiele verbunden ist.
Fig VIII. Der natürl. Saamenstaub, wie er in dem wässerigen Wesen
schwimmet. Fig. IX. X. Der vergrößerte Saamenstaub.


Tab. VII.
Fig. X.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. I.
Fig. IV.
Fig. VI.
a
Fig. II.
Fig. III.
Fig. VII.
Fig. V.
Soph. Brezin pinx. Ratisb.
I. M. Fridrich sc. R.

EXPLICATIO TABVLAE OCTAVAE.

AGARICVS OCTAVVS.

Eſt fungus hydrophorus, bicolor, villoſo-ſquamoſus, ſolitarius, carnis expers, intrinſecus fiſtuloſus; multa habens prioris, ſed omnino ab eo diuerſus; pileo ab initio ſaepe conico, plerumque tamen cylindraceo, denique campanulato ac plano; petiolo altiori & craſſiori, in origine bulboſo, ſurſim adtenuato; annulo ſaepiſſime fugaci, ſed ſine velo. Nomen *Bauaris* eſt nullum.

Fig. I. Fungus nondum euolutus, pileo conico & ſquamis lacero. Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo cylindraceo, inferiori parte piloſo, ſuperiori ſquamoſo. Fig. III. Fungus euolutus; pileo conico, multum iam reſoluto; annulo *a* ad baſin petioli relicto. Fig. IV. Fungus euolutus; pileo campanulato, maxima parte reſoluto, ora extrorſum conuoluta. Fig. V. Fungus euolutus, ad perpendiculum diſſectus, vbi *a* filum lanuginoſum ſeu araneoſum indicat, quo petioli medium donatum eſt. Pollen idem eſt, ac prioris agarici ſeptimi Tab. VII. Fig. VIII.IX.X.

Erklärung der achten Kupfertafel.

Der achte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, zottenſchuppiger, einzelner, gar nicht fleiſchiger, innwendig hohler, Waſſer- oder Miſtſchwam̃; welcher dem vorhergehenden zwar ſehr beykommt, in der That aber von ihm verſchieden iſt; mit einem anfangs, oft kegelartigen, meiſtentheils aber walzenförmigen, zuletzt glockenhaftigen oder platten Hute; mit einem hohen und ſtarken, unten knolligen, oben aber dünn auslaufenden, Stiele; mit einem unbeſtändigen Ringe, aber ohne Saamendecke. Iſt in Bayern ohne Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwam̃, mit einem kegelartigen, und, in Anſehung der Schuppen, zerriſſenen Hute. Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit walzenförmigen oben ſchuppigen, und unten haarigen, Hute. Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, mit kegelartigem und ziemlich verweſetem Hute; und wo der Ring unten am Stiele ſitzen geblieben iſt. Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit glockenförmigem, meiſt verweſetem Hute, und deſſen Rand außenher zuſammengerollet iſt. Fig. V. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm, wo der Buchſtabe *a* den wolligen oder ſpinnewebigen Faden andeutet, welcher in der Mitte des Schwammes bemerket wird. Der Saamenſtaub iſt eben ſo, wie bey dem vorigen ſiebenden Schwamme Tab. VII. Fig. VIII. IX. X.


Fab. VIII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
a
a
S. Beezin pinx. Ratisb.
G. L. sculps. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE NONAE.

AGARICVS NONVS.

Eſt fungus eſculentus, bi- vel tricolor, ſemper ceſpitoſus, mediocriter ramoſus, intrinſecus modo farctus, modo cauus, valde varius; pileo rarius regulari, perpetuo fere alio, ſeu deformi; petiolo ſupra annulum obſcure albo, infra eum colorato & ſquamuloſo; velo araneum referente; annulo perſiſtenti, ſed imperfecto. *Bauaris*, ex loco natali, *Stockſchwamm* dicitur.


Fig. I. Faſciculus fungorum, ætate, figura & directione valde diuerſorum. Fig. II. Faſciculus fungorum minorum, variae euolutionis. Fig. III. Faſciculus fungorum, pileis & petiolis magis regularibus. Fig. IV. Fungus nondum euolutus, velo araneum referente, pileo oblique diſſecto. Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus; pileo farcto, vermibus paululum exeſo. Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus, pileo cauo. Fig. VII. Pollen natiuus. Fig. VIII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der neunten Kupfertafel.

Der neunte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolches ein eßbarer, zwey- oder dreyfärbiger, allezeit vielfacher, etwas fleiſchiger, innwendig bald ganzer, bald hohler, und ungemein veränderlicher Schwamm; mit einem ſehr ſelten ordentlichen, faſt allezeit andern, oder ungeſtalteten, Hute; einem oberhalb des Ringes ſchmutzigweiſſen und glatten, unterhalb deſſelben gefärbten und zartſchuppigen Stiele; einer ſpinnewebigen Saamendecke und einem zwar beſtändigen, aber unvollkommenen, Ringe. Weil er auf alten Stöcken wächſet, hat er in Bayern den Namen Stockſchwamm.

Fig. I. Ein Büſchel dieſer Schwämme, von verſchiedenem Alter, Geſtalt und Lage. Fig. II. Ein Büſchel kleiner Schwämme, von verſchiedener Entwickelung. Fig. III. Ein Büſchel Schwämme, mit ziemlich ordentlich geſtalteten Hüten und Stielen. Fig. IV. Ein noch nicht entwickelter Schwam̃, mit ſeiner ſpinnewebigen Saamendecke. Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm, mit vollem, und von Würmern angefreſſenem, Stiele. Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm, mit hohlem Stiele. Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub. Fig. VIII. Der vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. IX.
Fig. I.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. VII.
Fig. VI.
Fig. VIII.
Soph. Beezin pinx. Ratisb.
Anon sculps. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE.

AGARICVS DECIMVS.

Eſt fungus bi- ſiue tricolor, ſolitarius, paululum carnoſus, intrinſecus integer, modice mutabilis; pileo ab initio faſtigiato, poſt campanulato ſeu conuexo, plus minus ſtriato; petiolo ad baſin craſſiuſculo, ſaepe tuberoſo, rarius vel denſius ſtriato; nec velo, nec annulo. Nomine in *Bauaria* caret.

Fig. I. Fungus fruſtulo trunci inſidens; pileo compreſſo, faſtigiato & parum euoluto.

Fig. II. Fungus multum euolutus.

Fig. III. Fungus euolutus, faciem inferiorem exhibens.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zehenden Kupfertafel.

Der zehende Blätterſchwamm

Es iſt ſolcher ein zwey- oder dreyfärbiger, einfacher, etwas fleiſchiger, innwendig voller, und wenig veränderlicher Schwam̃; mit einem anfangs zugeſpitzten, nachher glockenartigen oder gewölbten, mehr oder weniger geſtrichelten Hute; einem unten dicklich auslaufenden, oft knolligen, wenig oder ſtark geſtrichelten Stiele; aber ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm, wie er einem Stückgen Holze aufſitzet, mit zuſammengedrücktem und etwas entwickeltem Hute.

Fig. II. Ein ſtark entwickelter Schwamm.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, wie ſich ſeine Unterfläche zeiget.

Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. X.
Fig. V.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. VI.
Fig. III.
Fig. IV.
Soph. Beezin pinx. Ratisb.
Anon sculps. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE VNDECIMAE.

AGARICVS VNDECIMVS.

Est fungus esculentus, vnicolor, interdum multicolor, plerumque solitarius, carnosus, paululum cauus, sat variabilis, totus succo, quem læsus plorat, turgens sanguineo; pileo vel plano & in centro excauato, vel infundibuliformi; petiolo fere cylindraceo; nec velo, nec annulo. *Bauaris* dicitur *Hirschling*.


Fig. I. II. Fungi minores; quorum minimus exigua pilei parte pileo maioris adnatus est. Fig. III. Fungus valde deformis. Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus, vbi *a a* lacrimae sanguineae, quas laesus plorat. Fig. V. Fungus euolutus, pileo plano. Fig. VI. Fungus euolutus, faciem inferiorem sistens, cum lacrimis *a a* sanguineis. Fig. VII. Fungi duo multicolores, pileis eleuatis & plicatis. Fig. VIII. Fungus maximus, infundibuliformis. Fig. IX. Fungus valde infundibuliformis, compressus. Fig. X. XI. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der eilften Kupfertafel.

Der eilfte Blätterschwamm.

Es ist solcher ein eßbarer, einfärbiger, bisweilen vielfärbiger, meist einfacher, fleischiger, etwas hohler, ziemlich veränderlicher, und mit einem blutrothen Safte beschwängerter Schwam̃, welcher angestochen solchen thränenartig entlässet; mit einem flachen und in der Mitten vertieften, oder trichterförmigen Hute; einem fast wellenartigen Stiele; ohne Saamendecke und Ring. In Bayern heißt er Hirschling.

Fig. I. II. Kleine Schwämme, davon der kleineste mit einem sehr geringen Theile seines Hutes dem Hute des größern angewachsen ist. Fig. III. Ein ungestalteter Schwamm. Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwam̃, wo *a a* die blutigen Thränen sind, welche er verletzet zu weinen scheinet. Fig. V. Ein entwickelter Schwamm mit flachem Hute. Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche und mit blutigen Thränen *a a*. Fig. VII. Zween vielfärbige Schwämme, mit aufgestilptem und gefaltenem Hute. Fig. VIII. Ein sehr großer trichterförmiger Schwamm. Fig. IX. Ein trichterförmiger und zusammengedrückter Schwamm. Fig. X. XI. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Soph. Beezin pinx. Ratisb.

G. P. Nußbiegel sculps. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE DVODECIMAE.

AGARICVS DVODECIMVS.

Est fungus bi- vel tricolor, piloso-striatus, totus lacteus, solitarius, carne porosa, paululum cauus, priori quodammodo adsimilis, sed vere diuersus; pileo ab initio rotundo-conuoluto, post vel plano, vel infundibuliformi, in centro semper excauato; pileo vel recto, vel parum curuato; velo piloso, sed sine annulo. *Bauaris* dicitur *Wilder Hirschling*.


Fig. I. Fungus nondum euolutus, velo piloso. Fig. II. Idem fungus, ad perpendiculum dissectus. Fig. III. Fungus paululum euolutus, centro pileoli excauato. Fig. IV. Fungus multum euolutus, cuius non modo facies inferior, sed & lac *aa*, quod laesus plorat, cernitur. Fig. V. Fungus euolutus, modice infundibuliformis, ad perpendiculum dissectus. Fig. VI. Fungus explicatus, centro excauato, ora pilosa. Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zwölften Kupfertafel.

Der zwölfte Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zwey- oder dreyfärbiger, haariggestrichelter, einfacher, löcherigfleischiger, und etwas hohler Milchschwamm, welcher dem vorhergehenden zwar gleich siehet, von ihm aber gänzlich verschieden ist; mit einem anfänglich rund zusammengerollten, nachmals flachen oder trichterförmigen, in der Mitten allezeit vertieften Hute; mit einem geraden oder gebogenen Stiele; mit einer haarigen Saamendecke, aber ohne Ring. In Bayern wird er Wilder Hirschling genennet.

Fig. I Ein noch unentwickelter Schwamm, mit seiner haarigen Saamendecke. Fig. II. Eben dieser Schwamm, senkrecht zerschnitten. Fig. III. Ein etwas entwickelter Schwamm, mit einem in der Mitten vertieften Hute. Fig. IV. Ein stark entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche und thränenartigen Milch *a a*. Fig. V. Ein entwickelter, etwas trichterförmiger, und senkrecht zerschnittener Schwamm. Fig. VI. Ein ziemlich entwickelter, in der Mitten vertiefter und am Rande haariger Schwamm. Fig. VII, VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.


Tab. XII.
Fig. I.
Fig. III.
Fig. II.
a a
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Soph. Beezin pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE TERTIAE.

AGARICVS DECIMVS TERTIVS.

Eſt fungus vnicolor, tam ſolitarius, quam ceſpitoſus, parum carnoſus, parumque intrinſecus cauus, omnium maxime varius; pileo adeo multiformi, vt nihil certi determinari queat; petiolo pariter vario, ad baſin plerumque craſſiuſculo & obtuſo; absque velo, annuloque vel nullo, vel imperfecto. Nomen in *Bauaria* habet nullum.

Fig. I. Fungus fere euolutus, pileo valde exiguo.
Fig. II. Faſciculus fungorum, pileis plicatis.
Fig. III. Fungus paulum euolutus, petiolo tortuoſo.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Fungus explicatus, cuius facies inferior maxime conſpicitur.
Fig. VI. Fungus pileo ſingulariter plicato & reuoluto, annulo imperfecto.
Fig. VII. Fungus pileo conuexo, in ambitu lacero.
Fig. VIII. Fungus euolutus, pileo fere plano, ad oram lacero & plicato.
Fig. IX. X. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der dreyzehenden Kupfertafel.

Der dreyzehende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfacher, ſowohl einzelner, als vielfacher, wenig fleiſchiger und innerlich wenig hohler, vor vielen andern ſehr veränderlicher Schwam̄; mit einem dergeſtalt mannigfaltigen Hute, daß ſich nichts beſtimmtes angeben läſſet; mit einem eben ſo veränderlichen, unten meiſtentheils dicklichen und zugeſpitzten Stiele; ohne Saamendecke, und mit gar keinem oder unvollkommenen Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I Ein faſt entwickelter Schwamm, mit einem ſehr kleinen Hute.
Fig. II. Ein Büſchel Schwämme, mit gefaltenen Hüten.
Fig. III. Ein etwas entwickelter Schwamm, mit einem geſchlängelten Stiele.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, deſſen Unterfläche ſonderlich ſichtbar iſt.
Fig. VI. Ein auf beſondere Art gefaltener und aufgeſchlagener Schwamm, mit unvollkommenem Ringe.
Fig. VII. Ein Schwamm mit gewölbtem und am Rande zerriſſenem Hute.
Fig. VIII. Ein entwickelter Schwamm, mit faſt flachem, am Rande zerriſſenem und gefaltenem Hute.
Fig. IX. X. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. XIII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. X.
Soph. Beezin pinx. Ratisb.
Trautner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE QVARTAE.

AGARICVS DECIMVS QVARTVS.

Est fungus bicolor, plerumque simplex, carnosus, intrinsecus farctus, valde variabilis; pileo vel conico, vel campanulato, saepissime irregulari; petiolo cylindraceo, vel recto, vel curuato; nullo velo, nec annulo. Nomen in *Bauaria* desideratur.

Fig. I. Fungus paululum euolutus, pileo campanulato.
Fig. II. Fungus euolutus, fissus & quasi irregulari-tripetalus.
Fig. III. Fungus euolutus, pileo in centro eleuato & fastigiato.
Fig. IV. Fungus euolutus, pileo fere plano.
Fig. V. VI. VII. Fungorum nondum euolutorum varietates, multa aqua imbutorum.
Fig. VIII. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IX. Fungus ad perpendiculum dissectus.
Fig. X. Fungorum aceruus, quorum maximus pileo conico; reliqui valde deformes, pileis partim donati *a a a*, partim eis *b b b b* destituti.
Fig. XI. XII. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der vierzehenden Kupfertafel.

Der vierzehende Blätterschwamm.

Es ist ein zweyfärbiger, insgemein einfacher, fleischiger, innwendig voller, und sehr unbeständiger Schwamm; mit einem kegelartigen oder glockenförmigen, meist aber ungleichen Hute; mit einem wellengleichen, geraden oder gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein etwas entwickelter Schwamm, mit glockenförmigem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter, gespaltener und gleichsam ungleichdreyblätteriger Schwamm.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, mit einem in der Mitten aufgethürmten und zugespitzten Hute.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit fast flachem Hute.
Fig. V. VI. VII. Abänderungen unentwickelter Schwämme, stark mit Wasser angesauget.
Fig. VIII. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.
Fig. IX. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. X. Ein Haufen Schwämme, davon der größeste mit einem kegelartigen Hute; die übrigen ungestalt, theils mit Hüten *aaa*, theils ohne Hüte *bbbb* sind.
Fig. XI. XII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



Soph. Beezin pinx. Ratisb. A. L. Wirsing sc. Norimberg

EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE QVINTAE.

AGARICVS DECIMVS QVINTVS.

Est fungus nociuus, bicolor, solitarius, intrinsecus plenus, paululum carnosus, & colore & figura diuersus; pileo ab initio plerumque conuexo, post plano vel infundibuliformi; petiolo basi nunc latiori, nunc angustiori, longiori vel breuiori, recto vel curuo; tam velo, quam annulo destitutus. Ob vires emeticas in *Bauaria* dicitur *Speyteufel.*


Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo conuexo & integro.
Fig. II. Fungus euolutus; pileo infundibuliformi & plicato.
Fig. III. Fungus explicatus, faciem inferiorem sistens.
Fig. IV. Fungus maior, pileo plano, in ambitu paululum reuoluto.
Fig. V. VI. Fungi diuersae magnitudinis; pileis incisis, quasi reniformibus.
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der funfzehenden Kupfertafel.

Der funfzehende Blätterschwamm.

Es ist solches ein schädlicher, zweyfärbiger, einzelner, innwendig voller, etwas fleischiger, sowohl der Farbe, als Gestalt, nach sehr abweichender Schwamm; mit einem anfangs meist gewölbten, nachher flachen oder trichterförmigen, Hute; einem bald breit, bald schmal, auslaufenden, kürzern oder längern, geraden oder gebogenen Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Heißt in Bayern, weil er Brechen oder Speyen zu erregen pfleget, Speyteufel.

Fig. I. Ein unentwickelter Schwamm, mit gewölbtem und ganzem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, mit trichterförmigem und gefaltenem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein großer Schwamm, mit flachem und am Rande etwas aufgeschlagenem Hute.
Fig. V. VI. Zween ungleich große Schwämme, mit eingeschnittenen und gleichsam nierenartigen Hüten.
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.


Tab. XV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisbon.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE SEXTAE.

VARIAE AGARICI DECIMI QVINTI VARIETATES.

Ex pluribus obſeruationibus certo edoctus ſum, colorem antecedentis agarici decimi quinti, omnium maxime eſſe inconſtantem. Hinc omnes huius tabulae icones non niſi varietates eiusdem ſunt agarici nociui.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano, circa centrum potiſſimum rubeſcens.

Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus, vermibus eroſus.

Fig. IV. Fungus euolutus; pileo in centro depreſſo, ora ſtriata.

Fig. V. Fungus colore nigreſcente & ora tantum rubore tincto.

Fig. VI. Fungus pallide rubeſcens, pileo reniformi.

Erklärung der ſechzehenden Kupfertafel.

Einige Abänderungen des funfzehenden Blätterſchwammes.

Vermöge häufiger Wahrnehmungen bin ich vergewiſſert worden, daß die Farbe des vorhergehenden funfzehenden Blätterſchwammes ungemein veränderlich und verſchieden ſey. Alle Abbildungen dieſer Kupfertafel ſind alſo nichts, als Abweichungen eben deſſelben ſchädlichen Schwammes.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, um den Mittelpunkt röthlichem Hute.


Fig. II. Eben derſelbe Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.

Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm, von Würmern angefreſſen.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit einem in der Mitten eingedruckten und am Rande geſtrichelten Hute.

Fig. V. Ein grünlicher und nur am Rande etwas röthlicher Schwamm.

Fig. VI. Ein blaßrother Schwamm, mit nierenähnlichem Hute.


Tab. XVI.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Soph. Beezin pinx. Rat.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS DECIMVS SEXTVS.

Est fungus hydrophorus, tricolor, cespitosus, intrinsecus cauus, vix carnosus, valde mutabilis; pileo ab initio conico, post campanulato, denique fere plano & vertice plerumque fastigiato; petiolo cylindraceo, varie curuo, raro basi crassiore; nullo velo, sed annulo spurio & fugaci. Nomen in *Bauaria* desideratur.

Fig. I. Fasciculus fungorum, diuersae magnitudinis & euolutionis.
Fig. II. Fungus nondum euolutus; cum annulo, veli officium faciente.
Fig. III. Fungus multum euolutus; pileo campaniformi & ora inciso.
Fig. IV. Fungus euolutus, faciem exhibens inferiorem.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.
Fig. VI. VII. Fungi euoluti, diuersi coloris; pileis in centro fastigiatis, ora incisis & euolutis, quasi multifidis.
Fig. XIII. Pollen natiuus, liquamini immersus.
Fig. IX. Pollen vitro auctus.

Erklärung der siebenzehenden Kupfertafel.

Der sechzehende Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, vielfacher, innwendig hohler, wenig fleischiger, und sehr veränderlicher Wasserschwam̃; mit anfänglich kegelartigem, nachmals glockenförmigem, endlich etwas flachem und in der Mitten meistens zugespitztem Hute; mit walzenförmigem, auf mancherley Art gebogenem, und selten unten dicklichem, Stiele; ohne Saamendecke; jedoch mit einem unbeständigen Afterringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedener Größe und Entwickelung.
Fig. II. Ein noch entwickelter Schwamm; mit einem Ringe, welcher anfangs zugleich die Stelle der Saamendecke vertritt.
Fig. III. Ein ziemlich entwickelter Schwamm; mit glockenförmigem und am Rande eingeschnittenem Hute.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.
Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. VI. VII. Zween entwickelte Schwämme, von verschiedener Farbe; mit Hüten, welche in der Mitten zugespitzt, am Rande zusam̃engerollt, und gleichsam vielspaltig sind.
Fig. VIII. Der natürliche Saamenstaub, wie er in dem Wasser schwimmet.
Fig. IX. Der vergrößerte Saamenstaub.



St. Loibel pinx. Ratisb. Trauttner sc. Norimb.

AGARICVS DECIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus modo vnicolor, modo bicolor, tam ſimplex, quam multiplex, intrinſecus cauus, parum carnoſus, varius; pileo ab initio vel rotundo, vel conico, poſt campanulato vel plano, ſuperficie & ora vel integris vel laceratis & ſquamoſis, vertice ſaepe vel depreſſo & quaſi excauato vel faſtigiato; petiolo tuberoſo, recto vel curuato; ſine velo, ſed annulo & perſiſtente & fugaci. Nomen in *Bauaria* abeſt.


Fig. I. Fungi tres, baſi connati; pileis parum euolutis.
Fig. II. Fungus nondum euolutus, annulo pileo adhaerente.
Fig. III. Fungus paululum euolutus; pileo ſquamoſo, orae annuli particulis adhaerentibus, vertice depreſſo. Eius baſi fungulus alius adſtat.
Fig. IV. Fungus nondum euolutus; vertice depreſſo & quaſi excauato.
Fig. V. Fungus nondum euolutus; pileo conico, vertice eleuato.
Fig. VI. Fungus euolutus; pileo ſquamoſo, ora piloſo, vertice eleuato.
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der achtzehenden Kupfertafel.

Der ſiebenzehende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein theils einfärbiger, theils vielfärbiger, ſo wohl einfacher als vielfacher, innwendig hohler, wenig fleiſchiger, und veränderlicher Schwamm: mit einem anfangs runden oder kegeligen, nachmals glockigen oder flachen, an der Oberfläche und am Rande ganzen oder zerriſſenen und ſchuppigen, in der Mitten oft eingedruckten und gleichſam ausgehöhlten oder zugeſpitzten Hute; mit knolligem, geradem oder gekrüm̃tem Stiele; ohne Saamendecke, wohl aber mit beſtändigem oder unbeſtändigem Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Drey unten zuſammengewachſene Schwäm̃e; mit einem etwas entwickelten Hute.
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm, wo der Ring vom Stiele abgelöſet und dem Hute gefolget iſt.
Fig. III. Ein etwas entwickelter Schwam̃; mit ſchuppigem, in der Mitten eingedruckten Hute, und deſſen Rande Ueberbleibſel des Ringes anhängen. Unten befindet ſich ein anderer kleiner Schwamm.
Fig. IV. Ein unentwickelter Schwam̃; mit eingedrucktem und faſt ausgehöhltem Wirbel.
Fig. V. Ein unentwickelter Schwam̃; mit kegelartigem und oben eingedrucktem Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit ſchuppigem, am Rande haarigen und in der Mitte aufgethürmtem Hute.
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. XVIII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
St. Loibel pinx. Rat.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE DECIMAE NONAE.

VARIETATES AGARICI DECIMI SEPTIMI.

Varietates agarici antecedentis decimi ſeptimi, & colore, & figura, adeo ſunt diuerſae, vt vix eiusdem ſpeciei videantur; hinc operae pretium duxi, icones huius tabulae addere.

Fig. I. Fungus in ipſo euolutionis actu; pileo ora lacero, piloſo & inuoluto; annulo perſiſtente.

Fig. II. Par fungorum, baſi connatorum; quorum minor nondum euolutus, pileo globoſo; maior euolutus, pileo campanulato & ora lacero; annulo nullo.

Fig. III. Fungus duplici quaſi annulo donatus, quorum alter petiolo, alter pileo adhaeret.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. V. Par fungorum; pileis euolutis, ora laceris, quaſi multifidis, nec non piloſis.

Fig. VI. Fungulus nondum euolutus, pileo conico.

Erklärung der neunzehenden Kupfertafel.

Abänderungen des ſiebenzehenden Blätterſchwammes.

Da der vorige ſiebenzehende Blätterſchwamm ſowohl der Farbe, als der Geſtalt nach, unter ſo manchen Abweichungen vorkommt, daß man ſie kaum vor einerley Art halten ſollte; ſo habe ich es vor gut angeſehen, noch einige beſondere Abbildungen auf dieſer Tafel zu liefern.

Fig. I. Ein ſich eben entwickelnder Schwamm; mit einem am Rande zerriſſenen, haarigen und einwärts gerollten Hute; mit beſtändigem Ringe.


Fig. II. Ein Paar unten zuſammengewachſene Schwämme; davon der kleinere unentwickelt, mit kugelrundem Hute; der größere entwickelt iſt, mit glockigem und am Rande zerriſſenem Hute; ohne Ring.

Fig. III. Ein Schwamm mit gleichſam doppeltem Ringe, davon der eine an dem Stiele, der andere am Hute, ſich befindet.

Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. V. Ein Paar Schwämme; mit entwickelten, am Rande zerriſſenen, gleichſam vielſpaltigen, und zugleich haarigen Hüten.

Fig. VI. Ein noch unentwickeltes Schwämmgen, mit kegeligem Hute,


Tab. XIX.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE.

AGARICVS DECIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus volua ſpuria exceptus, bicolor vel tricolor, intrinſecus farctus, praeter petiolum vix carnoſus, parum mutabilis; pileo plerumque conuexo ſeu puluinato, laeui vel ſquamoſo; petiolo tuberoſo; velo membranaceo & annulo perſiſtente. *Bauaris* nomen eſt ignotum.

Fig. I. Fungulus nondum euolutus, voluaeque ſpuriae praeter pileum nondum egreſſus.

Fig. II. Fungus nondum euolutus; velo membranaceo, ex voluaque ita egreſſus, vt illius vix veſtigium adpareat.

Fig. III. Fungus e volua egreſſus; parum euolutus; annulo perſiſtente.

Fig. IV. Fungus euolutus; pileo ſquamoſo; annulo perſiſtente.

Fig. V. Fungus e volua erumpens.

Fig. VI. Fungus euolutus; pileo integro ſeu laeui, ora ſtriato.

Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zwanzigſten Kupfertafel.

Der achtzehende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zwey- oder dreyfärbiger, innwendig voller, außer dem Stiel wenig fleiſchiger, nicht viel veränderlicher, und unächter Eyſchwamm; mit meiſtentheils gewölbtem oder ausgeſtopftem, glattem oder ſchuppigem Hute; mit knolligem Stiele; mit häutiger Saamendecke, und beſtändigem Ringe. In Bayern hat er keinen Namen.

Fig. I. Ein unentwickelter kleiner Schwamm, und welcher, außer dem Hute, noch in dem Aftereye ſtecket.

Fig. II. Ein unentwickelter Schwamm, mit häutiger Saamendecke, und welcher aus ſeinem Eye alſo emporgeſtiegen, daß davon kaum etwas zu ſpühren iſt.

Fig. III. Ein aus dem Eye emporgeſtiegener und etwas entwickelter Schwamm; mit beſtändigem Ringe.


Fig. IV. Ein entwickelter Schwam̃; mit ſchuppigem Hute und beſtändigem Ringe.

Fig. V. Ein Schwamm, wie er aus dem Eye ſich erhebet.

Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit ganzem oder glattem, und am Rand geſtricheltem Hute.

Fig. VII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. XX
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Noromb.

EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE PRIMAE.

AGARICVS DECIMVS NONVS.

Est fungus vnicolor, plerumque solitarius, carnosus, intrinsecus farctus, figura & colore varius; pileo ab initio conico, post vel campanulato & in centro fastigiato, vel plano & in centro depresso, vel irregulari; petiolo cylindraceo, basi paullo crassiori; nec velo, nec annulo donatus. Nomen *Bauaris* ignotum.


Fig. I. Fungus paullulum euolutus; pileo fastigiato & granulis quasi adsperso; cui infra minimus nondum explicatus adnexus est.
Fig. II. Fungus magis euolutus; pileo etiam fastigiato, sed striulis notato.
Fig. III. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.
Fig. V. Fungus euolutus; pileo plano, in centro depresso & granulato; cui infra plures minores adstant.
Fig. VI. Fungus irregularis; pileo inciso, & quasi reniformi.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der ein und zwanzigsten Kupfertafel.

Der neunzehende Blätterschwamm.

Es ist ein einfärbiger, meistentheils einfacher, fleischiger, innwendig voller, der Gestalt und Farbe nach verschiedener Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachher entweder glockigen und in der Mitten zugespitzten, oder flachen und in der Mitten vertieften, oder auch unförmlichen Hute; mit einem runden, unten etwas dickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein etwas entwickelter Schwam̃; mit zugespitztem und chagrinartigem Hute; und welchem unten ein sehr kleiner noch unentwickelter Schwamm beystehet.
Fig. II. Ein ziemlich entwickelter Schwamm; mit einem zugespitzten und gestrichelten Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit einem flachen, in der Mitten vertieften und chagrinartigen Hute; und an welchem unten mehrere kleinere sich befinden.
Fig. VI. Ein ungestalteter Schwamm; mit einem eingeschnittenen und gleichsam nierenförmigen Hute.
Fig. VII, IIX. Der natürliche und vergrößerte Saamenstaub.



St. Loibel pinx. Ratisb. Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS VICESIMVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, interdum multiplex, vix carnoſus, intrinſecus cauus & quaſi aranea circumdatus, valde variabilis, volua ſpuria exceptus; pileo ab initio conico vel cylindraceo, integro vel lacerato, ſaepe ſquamoſo, poſt campanulato vel plano; petiolo cylindraceo, tuberoſo, integro vel lacerato ſeu ſtriato-ſquamoſo, compreſſo & occulto, vel explicato & altiori; nullo quidem velo, ſed eius loco magno, & quaſi duplici, annulo perſiſtenti praeditus. Nomen in *Bauaria* deſideratur.


Fig. I. Par fungorum nondum explicatorum, quorum dextri volua ſpuria pileo ſiniſtri impoſita. Fig. II. Fungus nondum explicatus; petiolo adhuc ſub pileo latente. Fig. III. Fungus nondum euolutus, ad perpendiculum diſſectus. Fig. IV. Trias fungorum nondum explicatorum, baſi ſeu volua ſpuria connexorum, petiolis paululum adparentibus Fig. V. Fungus nondum euolutus; petiolo ex volua ſpuria eleuato ſeu adſcendente. Fig. VI. Fungus nondum explicatus, pileo colore dilutiori.

Erklärung der zwey und zwanzigſten Kupfertafel.

Der zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein zweyfärbiger, einzelner, auch manchmal vielfacher, wenig fleiſchiger, innwendig hohler, und wie mit einer Spinnewebe umkleideter, ſehr veränderlicher, unächter Eyſchwam̃; mit einem anfangs kegeligen oder wellenartigen, ganzen oder zerriſſenen und oft ſchuppigen, nachher glockigen oder flachen Hute; mit einem runden, knolligen, ganzen oder zerriſſenen, oder auch geſtricheltſchuppigen, zuſammengepreßten und verborgenen, oder entwickelten und hohen Stiele; ohne Saamendecke, an deren Stelle aber mit einem großen, und gleichſam doppelten, beſtändigen Ringe verſehen. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar unentwickelte Schwämme, wo das Afterey zur rechten Hand dem Hute des andern zur linken Hand aufliegt. Fig. II. Ein unentwickelter Schwam̃; mit einem annoch unter dem Hute verborgenen Stiele. Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener unentwickelter Schwam̃. Fig. IV. Drey unentwickelte Schwämme, welche unten mit ihren Aftereyen zuſammengewachſen, die Stiele aber etwas ſichtbar ſind. Fig. V. Ein unentwickelter Schwamm; mit einem aus dem Afterey emporgeſtiegenen Hute. Fig. VI. Ein unentwickelter Schwam̃, mit hellfarbigem Hute.



St. Loibel pinx. Ratisb. G. P. Nußbiegel sc. Noremb.

EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE TERTIAE.

AGARICI PRAECEDENTIS VARIETATES ET POLLEN.

Agaricus praecedens vicesimus ante & per explicationem tam innumeris variat modis, vt plures iconum tabulas possem edere. Expertus tamen sum, vnam alteramue iconem sufficere, ad hunc fungum numquam non distinguendum.

Fig. I. Fungus dimidia parte euolutus; pileo campaniformi, facie superiori lacerato, striato, squamoso; petiolo alto & lacerato.

Fig. II. Fungus nondum euolutus; pileo cylindraceo, in centro fastigiato, squamoso, lacerato.

Fig. III. Fungus paullulum euolutus; ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der drey und zwanzigsten Kupfertafel.

Abänderungen, nebst dem Saamenstaube, des vorhergehenden Blätterschwammes.

Der vorhergehende zwanzigste Blätterschwamm verändert sich, vor und unter der Entwickelung, so mannigfaltig, daß man mehrere Tafeln mit Abbildungen liefern könnte. Es ist jedoch auch eine und die andere Abbildung schon hinreichend, diese Schwam̃art von andern zu unterscheiden.

Fig. I. Ein halbentwickelter Schwamm; mit glockigem, zerrissenem, gestricheltem und schuppigem Hute; und mit hohem und zerrissenem Stiele.

Fig. II. Ein unentwickelter Schwamm; mit rundem, in der Mitten zugespitztem schuppigem und zerrissenem Stiele.

Fig. III. Ein etwas entwickelter Schwamm; senkrecht zerschnitten.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrösserte Saamenstaub.



St. Loibel pinx. Rat. G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE QVARTAE.

AGARICVS VICESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus ſericus, ſolitarius, intrinſecus farctus, carnoſus, volua ſpuria exceptus, parum varius; pileo ab initio haemiſphaerico, poſt conuexo, facie vel vndulata, vel granulata, vel ſtriata; petiolo breui, cylindraceo, ſat tuberoſo; velo araneum vel fila ſerica referente, ſed annulo deſtitutus. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo haemiſphaerico, voluae ſpuriae adnexo.

Fig. II. Fungus ſe explicans; pileo vndulato.

Fig. III. Fungus fere explicatus; pileo vndulato & ex parte irregulari.

Fig. IV. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus euolutus; pileo conuexo, ſtriato.

Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der vier und zwanzigſten Kupfertafel.

Der ein und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolches ein ſeidenartiger, einzelner, innwendig voller, fleiſchiger, unächter und wenig veränderlicher Eyſchwamm; mit einem anfangs halbkugelrunden, nachher gewölbten, gewäſſerten, oder chagrinartigen, oder geſtrichelten Hute; einem kurzen, runden und ſtark knolligen Stiele; einer ſpinnewebigen oder seidenfadigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein unentwickelter Schwamm; mit halbkugelrundigem, und dem Aftereye genau aufſitzendem Hute.

Fig. II. Ein ſich entwickelter Schwamm; mit gewäſſertem Hute.


Fig. III. Ein faſt entwickelter Schwamm; mit gewäſſertem und zum Theile unförmlichem Hute.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.

Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem und geſtricheltem Hute.

Fig. VI. Ein ſenkrechtzerſchnittener Schwamm.

Eig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XXIV.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. I.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Leibel pinx. Rat.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE QVINTAE.

AGARICVS VICESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus vnicolor, modo ſimplex, modo multiplex, intrinſecus farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio conico, poſt conuexo vel plano, ſuperficie ſquamoſo-ſtriata; petiolo cylindraceo, ſtriato, baſi plerumque craſſiori; ſine velo & annulo. Nomen in *Bauaria* habet nullum.


Fig. I. Fungus nondum euolutus.
Fig. II. Par fungorum euolutorum, petiolis baſi connatorum.
Fig. III. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Fungus explicatus, petiolo tuberoſo.
Fig. VI. Par fungorum, petiolis connexorum, pileis conicis.
Fig. VII. Funguli figura & explicatione diuerſi.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der fünf und zwanzigſten Kupfertafel.

Der zwey und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolches ein einfärbiger, bald einfacher, bald vielfacher, innwendig voller, fleiſchiger, und wenig veränderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachher gewölbten oder flachen, und ſchuppiggeſtrichelten Hute; einem runden, geſtrichelten, und unten insgemein dicklich auslaufenden Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein unentwickelter Schwamm.
Fig. II. Ein Paar entwickelte, und unten mit ihren Stielen zuſammengewachſene, Schwämme.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm.
Fig. VI. Ein Paar mit ihren Stielen zuſammengewachſene Schwämme, mit kegeligen Hüten.
Fig. VII. Einige Schwämmgen, von verſchiedener Geſtalt und Entwickelung.
Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XXV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. IX
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. VIII.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE SEXTAE.

AGARICVS VICESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus bicolor vel tricolor, ſimplex, intrinſecus farctus, carnoſus, parum varius; pileo fere ſemper conico, ſtriis longitudinalibus notato, interdum planiuſculo & in centro faſtigiato; petiolo cylindraceo, modo tenuiori, modo craſſiori; velo & annulo orbatus. Nomen *Bauaris* eſt nullum.

Fig. I. Fungus parum euolutus; pileo conico; petiolo craſſiori.

Fig. II. Fungus magis euolutus; pileo planiuſculo, in centro faſtigiato; petiolo tenuiori.

Fig. III. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus maior, pileo conico, petiolo craſſo.

Fig. V. Idem fungus, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VI. Fungus parum euolutus; pileo compreſſo, conico, ora fiſſo & quaſi quinquifido.

Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der sechs und zwanzigsten Kupfertafel.

Der drey und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist ein zwey- oder dreyfärbiger, einfacher, innwendig voller, fleischiger, wenig veränderlicher Schwamm; mit einem fast allezeit kegeligen, und länglichgestrichelten, bisweilen etwas flachen und in der Mitten zugespitzten, Hute; einen runden, bald dünnern, bald dickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute, und etwas dickem Stiele.

Fig. II. Ein ziemlich entwickelter Schwamm; mit einem etwas flachen, in der Mitten zugespitzten Hute und einem dünnen Stiele.


Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein etwas grosser Schwamm, mit kegeligem Hute und dickem Stiele.

Fig. V. Eben dieser Schwamm, senkrecht zerschnitten.

Fig. VI. Ein etwas entwickelter Schwam̃; mit gedrucktkegeligem, am Rande gespaltenem, und gleichsam fünffach eingeschnittenem Hute.

Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.


Tab. XXVI.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS VICESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus muſcarius, bicolor, ſimplex, farctus, carnoſus, parum varius, volua ſpuria exceptus; pileo ante explicationem rotundo, volua laeui ſeu ſcabra inuoluto, poſt explicationem conico, deinde conuexo, & per ætatem in centro depreſſo ac infundibuliformi, voluae laceratae fragmentis, gemmas quaſi referentibus, ſaepiſſime maculato; petiolo duriuſculo, tuberoſo, ſaepe tenuiter ſtriato & ad baſin lacerato; velo lato, membranaceo, ſimilique annulo, perſiſtenti ac lacerato, donatus. *Bauaros* nomen fugit.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo ſub volua ſcabra, & quaſi gemmata, latente. Fig. II. Fungus ſe explicans; pileo fragmentis voluae laceratae maculato. Fig. III. Fungus explicatus; pileo conuexo & gemmato; petiolo ad baſin lacerato. Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus. Fig. V. VI. Fungi duo diuerſi, quoad faciem inferiorem. *Pollen* idem eſt, ac tabulae ſequentis.

Erklärung der ſieben und zwanzigſten Kupfertafel.

Der vier und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einfacher, voller, fleiſchiger, wenig veränderlicher, unächter Eyſchwamm, und der bekannte Fliegenſchwamm; mit einem vor der Entwickelung rundlichen, und in dem glatten oder rauhen Aftereye verborgenen, nach der Entwickelung kegeligen, hierauf gewölbten, und zuletzt in der Mitten vertieften und trichterförmigen, auch von den zurückgebliebenen Stücken des Aftereyes weißgefleckten, und wie mit Steinen beſetzten, Hute; mit härtlichem, knolligem, oft zartgeſtricheltem, und unten zerriſſenem, Stiele; einer breiten, häutigen Saamendecke, und einem dergleichen beſtändigen und zerriſſenen Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein unentwickelter Schwamm; mit einem, unter dem rauchen, und gleichſam mit Steinen beſetzten, Aftereye verborgenen, Hute. Fig. II. Ein ſich entwickelnder Schwam̃; mit einem von dem zerriſſenen Aftereye geflecktem Hute. Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem und geſteineltem Hute, und einem unten zerriſſenem Stiele. Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwam̃. Fig. V. VI. Zween verſchiedene Schwämme, nach ihrer Unterfläche. Der Saamenſtaub befindet ſich auf der folgenden Kupfertafel.


Tab. XXVII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. V.
Fig. IV.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Trautner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE OCTAVAE.

VARIETAS AGARICI VICESIMI QVARTI.

Etſi fungus muſcarius praecedens ſaepiſſime maculatus ſe exhibet; varias tamen ob rationes interdum ſine vllis maculis offenditur. Hinc ſedulo cauendum, ne pro diuerſa ſpecie accipiatur.

Fig. I. Fungus ſe explicans; pilei ambitu fimbria alba ornato; veli fragmentis, annulos referentibus, ad baſin petioli relictis.

Fig. II. Fungus nondum explicatus; pilei facie inferiori volua, adhuc integra, tecta.

Fig. III. Fungus ſe euoluens; volua ex parte diſrupta.

Fig. IV. Fungus euolutus; pileo conuexo, ora maculato.

Fig. V. Fungus euolutus; quoad faciem inferiorem.

Fig. VI. Pollen natiuus.

Fig. VII. Pollen lente auctus.

Erklärung der acht und zwanzigſten Kupfertafel.

Abänderung des vier und zwanzigſten Blätterſchwammes.

Obgleich der vorhergehende Fliegenſchwamm mehrentheils geflecket, oder geſteinelt, erſcheinet; ſo trift man ihn doch auch oft ohne alle Flecken an. Man würde dahero gar ſehr irren, wenn man dieſe Schwammart vor eine beſondere Gattung halten wollte.

Fig. I. Ein ſich entwickelnder Schwamm; mit einem am Rande weiß eingefaßtem Hute; und an deſſen Stiele einige Stücken der Saamendecke, wie Ringe, hängen geblieben ſind.

Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; deſſen untere Hutfläche mit der noch ganzen Saamendecke überzogen iſt.


Fig. III. Ein ſich entwickelnder Schwam̃; deſſen Saamendecke an einer Seite ſich abgelöſet hat.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem, am Rande geflecktem, Hute.

Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.

Fig. VI. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. VII. Der vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. XXVIII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Nor.

EXPLICATIO TABVLAE VICESIMAE NONAE.

AGARICVS VICESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus, ob locum natalem, lignarius, vnicolor, & ſimplex & multiplex, farctus, carne duriuſcula, omnium maxime adeoque varius, vt vix certa figura determinari queat; pileo ſaepe conuexo ſeu planiuſculo, ſæpiſſime deformi, ſemper lacerato & ſquamoſo, lamellis connatis & dentatis; petiolo lacerato, ſtriato, ſquamoſo, ſaepe deformi; tam velo, quam annulo, orbatus. *Bauaris* nomen eſt ignotum.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo & petiolo ſquamoſo.

Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Idem fungus, inuerſus & ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der neun und zwanzigſten Kupfertafel.

Der fünf und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolches ein einfårbiger, theils einfacher, theils vielfacher, voller, hartfleiſchiger, und vor andern dergeſtalt veränderlicher Holzſchwamm, daß ſich keine beſtändige Geſtalt angeben låſſet; mit einem vielmals gewölbten oder etwas flachen, am hänfigſten ungeſtalteten, allezeit aber zerriſſenen und ſchuppigen Hute, wie auch zuſammengewachſenen und gezähneten Saamenblättern; mit einem zerriſſenen, geſtrichelten, ſchuppigen, und insgemein ungeſtalteten Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit ſchuppigem Hute und Stiele.

Fig. II. Eben derſelbe Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.

Fig. III. Eben derſelbe Schwamm, umgekehrt und ſenkrecht zerſchnitten.

Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XXIX.
Fig. I.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. II.
Fig. III.
Soph. Beezin pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE.

VARIETATES AGARICI VICESIMI QVINTI.

Quia fungus praecedens tricesimus semper lignis putrescentibus innascitur, explicatio eius ob loci angustiam & alias caussas saepius impeditur. Hinc innumerae fere varietates & figurae deformes adparent.

Fig. I. Fungi quatuor deformes, ex ligno enati.

Fig. II. Par fungorum explicatorum; quorum maior florem, minor infundibulum, refert.

Erklärung der dreyßigsten Kupfertafel.

Abänderungen des fünf und zwanzigsten Blätterschwammes.

Weil der vorhergehende dreyßigste Holzschwamm auf altem, und zum Theile faulem, Holze zu wachsen pfleget; so wird dessen Entwickelung, nach Beschaffenheit des Raums, und wegen anderer Zufälligkeiten, oft gehindert. Und eben dieses ist die Ursache, daß diese Schwammart fast immer unter einer andern, meist unförmlichen, Gestalt erscheinet.

Fig. I. Vier ungestallte Schwämme, wie sie aus dem Holze hervorgewachsen sind.

Fig. II. Ein Paar entwickelte Schwämme; davon der grössere eine Blume, der kleinere einen Trichter, vorstellet.


Tab. XXX.
Fig. I.
Fig. II.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE PRIMAE.

AGARICVS VICESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus tenuis, tricolor, interdum bicolor, plerumque multiplex, intrinſecus cauus, vix carnoſus, parum varius; pileo ab initio conico, poſt haemiſphaerico, ſemper vero ſulcato ſeu plicato; petiolo colorato, gracili & fragili; ſine velo & annulo. Nomen in *Bauaria* habet nullum.

Fig. I. Fungus minor, paullulum euolutus; pileo conico.
Fig. II. Fungus inuerſus, parum explicatus; pileo conico.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo haemiſphaerico.
Fig. IV. Fungus explicatus; multa aqua imbutus, hincque colore mutato.
Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. VI. Faſciculus fungorum, diuerſae magnitudinis, figurae ac explicationis.
Fig. VII. Fungus maior, explicatus.
Fig. IIX. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IX. X. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der ein und dreyßigsten Kupfertafel.

Der sechs und zwanzigste Blätterschwamm.

Es iſt ein zarter, dreyfärbiger, manchmal auch zweyfärbiger, insgemein vielfacher, innwendig hohler, faſt gar nicht fleiſchiger, und wenig veränderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachher halbrunden, allezeit aber gefurchten oder gefaltenen Hute; einem gefärbten, dünnen und zerbrechlichen Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein kleiner etwas entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.
Fig. II. Ein umgekehrter, ſehr wenig entwickelter Schwam̄; mit kegeligem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.
Fig. IV. Ein entwickelter, ſtark mit Waſſer angeſaugter Schwam̄, und welcher eben dadurch ſeine Farbe geändert.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VI. Ein Büſchel Schwämme, von verſchiedener Gröſſe, Geſtalt und Entwickelung.
Fig. VII. Ein etwas groſſer, entwickelter, Schwamm.
Fig. IIX. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IX. X. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XXXI
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX
Fig. X.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nusbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS VICESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus tenuis, vnicolor, raro bicolor, ceſpitoſus, intrinſecus cauus, vix carnoſus, parum varius; pileo ab initio conico, poſt haemiſphaerico, interdum planiuſculo, ſemper ſulcato vel plicato; petiolo cylindraceo, gracili & fragili; velo & annulo deſtitutus. *Bauaris* nomen eſt nullum.

Fig. I. Faſciculus fungorum, multa aqua ſaturatorum, variae figurae & explicationis.
Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Fungus nondum explicatus.
Fig. V. Faſciculus fungorum, paullulum arefactorum.
Fig. VI. Fungus arefactus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zwey und dreyßigſten Kupfertafel.

Der ſieben und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein zarter, einfärbiger, ſelten zweyfärbiger, vielfacher, innwendig hohler, faſt gar nicht fleiſchiger, und wenig veränderlicher Schwamm; mit einem, anfangs kegeligen, nachher halbrunden, bisweilen etwas flachen, allezeit aber gefurchten, oder gefaltenen, Hute; einem runden, dünnen und zerbrechlichen Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel ſtark mit Waſſer angeſaugter Schwämme, von verſchiedener Geſtalt und Entwickelung.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Ein unentwickelter Schwamm.
Fig. V. Ein Büſchel etwas dürrer Schwämme.
Fig. VI. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. XXXII
Fig. VIII.
Fig. VII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nussbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE TERTIAE.

AGARICVS VICESIMVS OCTAVVS.

Est fungus esculentus, bicolor, fere semper solitarius, intrinsecus farctus, carnosus, varius; pileo & ab initio & per aetatem incertae figurae, non raro deformi, saepissime vero squamoso, & tomentoso, ad oram lacerato; petiolo vario, cylindraceo, tuberoso, saepe deformi; velo coriaceo, annuloque persistenti, donatus. In *Bauaria* dicitur *Ehegärtel* seu *Champignon.*


Fig. I. Fungus nondum explicatus, lamellis velo tectis. Fig. II. Fungus explicatus; pileo squamoso, tomentoso, ad oram lacerato; petiolo cylindraceo. Fig. III. Fungus nondum euolutus, ad perpendiculum dissectus; petiolo tuberoso. Fig. IV. Fungus nondum euolutus; pileo & petiolo deformi. Fig. V. Fungus paullulum euolutus; petiolo fusiformi. Fig. VI. Fungus paullulum euolutus; pileo conuexo, ora lacerato, colore per aetatem mutato. Fig. VII. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem. IIX. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der drey und dreyßigsten Kupfertafel.

Der acht und zwanzigste Blätterschwamm.

Es ist ein eßbarer, zweyfärbiger, fast allezeit einzelner, innwendig voller, fleischiger, veränderlicher Schwamm; mit einem, sowohl anfangs, als mit der Zeit, unbeständigen, nicht selten unförmlichen, am häufigsten aber schuppigen, zottigen, und am Rande zerrissenen Hute; mit unbeständigem, rundem, knolligem, oft unförmlichem Stiele; einer lederhaften Saamendecke, und einem beständigen Ringe. In Bayern heißt er Ehegärtel, oder Champignon.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; dessen Saamenblätter, wegen der Saamendecke, unsichtbar sind. Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit schuppigem, zottigem, am Rande zerrissenem, Hute; und einem runden Stiele. Fig. III. Ein unentwickelter, senkrecht zerschnittener, Schwam̃; mit knolligem Stiele. Fig. IV. Ein unentwickelter Schwamm; mit ungestaltetem Hute und Stiele. Fig. V. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit dünn auslaufendem Stiele. Fig. VI. Ein etwas entwickelter Schwam̃; mit gewölbtem, am Rande zerrissenem, und die Farbe abgeändertem, Hute. Fig. VII. Ein unentwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche. Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.


Tab. XXXIII.
Fig. VIII.
Fig. II.
Fig. IX.
Fig. I.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE QVARTAE.

AGARICVS VICESIMVS NONVS.

Eſt fungus plerumque vnicolor, ſimplex, intrinſecus farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio rotundiuſculo, poſt conuexo, ſaepe in centro depreſſo ſeu excauato; petiolo tuberoſo; velo araneum referente, annulo nullo. *Bauari* nomen neſciunt.


Fig. I. Fungus explicatus; pileo in centro depreſſo & papillato.
Fig. II. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus euolutus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Fungus ſe explicans; velo araneoſo adhuc donatus.
Fig. V. Fungus parum euolutus; pileo in centro inciſo.
Fig. VI. Pollen natiuus.
Fig. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der vier und dreyßigſten Kupfertafel.

Der neun und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein insgemein einfärbiger, einfacher, innwendig voller, fleiſchiger, wenig veränderlicher Schwam̃; mit einem anfangs rundlichen, nachmals gewölbten, oft in der Mitten vertieften, oder ausgehöhlten Hute; einem knolligen Stiele; einer ſpinnenwebigen Saamendecke, aber ohne Ring. **Hat in Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten vertieften und warzigen Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein entwickelter, und ſenkrecht zerſchnittener, Schwamm.
Fig. IV. Ein ſich entwickelnder Schwamm; an welchem die ſpinnenwebige Saamendecke noch ſichtbar iſt.
Fig. V. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten eingeſchnittenen Hute.
Fig. VI. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VII. Der vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. XXXIV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Soph. Beezin pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Norimberg.

EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE QVINTAE.

AGARICVS TRICESIMVS.

Eſt fungus vnicolor, ſaepe bicolor, tam ſimplex quam multiplex, farctus, carnoſus, parum varius; pileo haemiſphaerico, in centro ſaepe faſtigiato; petiolo cylindraceo, ad baſin craſſiuſculo, & plerumque tortuoſo; velo araneoſo, ſed annulo orbatus. *Bauaris* nomen eſt nullum.


Fig. I. Faſciculus fungorum, variæ euolutionis, figuræ & magnitudinis.
Fig. II. Par fungorum, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Trias fungorum, quorum duo pileis faſtigiatis.
Fig. V. Fungus velo araneoſo adhuc donatus.
Fig. VI. Fungus euolutus; pileo in centro faſtigiato.
Fig. VII. Fungus nondum euolutus; pileo haemiſphaerico.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der fünf und dreyßigſten Kupfertafel.

Der dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein einfärbiger, oft zweyfärbiger, ſo wohl einfacher, als vielfacher, voller, fleiſchiger, wenig veränderlicher Schwamm; mit einem halbrunden, in der Mitten oft zugeſpitzten, Hute; einem runden, nach unten zu dicklichen und meiſt geſchlängelten Stiele; einer ſpinnenwebigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel Schwämme, von verſchiedener Entwickelung, Geſtalt und Gröſſe.
Fig. II. Ein Paar Schwämme, nach ihrer Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Drey Schwämme, deren zween zugeſpitzte Hüte haben.
Fig. V. Ein Schwamm, mit ſeiner ſpinnenwebigen Saamendecke.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwam̃; mit einem in der Mitten zugeſpitzten Hute.
Fig. VII. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.
Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XXXV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE SEXTAE.

AGARICVS TRICESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus viſcoſus, bicolor vel tricolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, pro aetate varius; pileo ab initio haemiſphaerico, poſt planiuſculo, tandem infundibuli forma; petiolo baſin verſus craſſiuſculo & colorato; velo viſcoſo, ſplendente & quaſi vitreo, annulo autem ſpurio, praeditus. Nomine apud *Bauaros* caret.

Fig. I. Fungus nondum explicatus; petiolo craſſo.
Fig. II. Fungus paullulum explicatus; petiolo tenuiori.
Fig. III. Fungus nondum euolutus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Fungus nondum explicatus, quoad faciem inferiorem, vt velum vitreum eo magis adpareat.
Fig. V. Fungus maior; pileo infundibulum referente.
Fig. VI. Fungus explicatus; pileo planiuſculo, in centro depreſſo.
Fig. VII. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der sechs und dreyßigsten Kupfertafel.

Der ein und dreyßigste Blätterschwamm.

Es iſt ein klebriger, zweyfärbiger, oder dreyfärbiger, einfacher, voller, fleiſchiger, und mit der Zeit veränderlicher Schwamm; mit einem anfangs halbrunden, nachher etwas flachen, zuletzt trichterigen Hute; mit einem nach unten zu dicklichen und gefärbten Stiele; einer klebrigen, glänzenden, und gleichſam gläſernen Saamendecke, und einem unächten Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein unentwickelter Schwamm; mit dickem Stiele.
Fig. II. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit dünnem Stiele.
Fig. III. Ein noch unentwickelter, und ſenkrecht zerſchnittener, Schwamm.
Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche, und wo die gläſerne Saamendecke ſehr kenntlich iſt.
Fig. V. Ein etwas groſſer Schwamm; mit trichterförmigem Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwam̃; mit etwas flachem, in der Mitten vertieftem, Hute.
Fig. VII. Eben derſelbe Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XXXVI.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
S. Loibel pinx. Rat.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS TRICESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo filamentis ſtriato, ab initio rotundo, ſaepe conico, deinde conuexo; petiolo cylindraceo, ſimiliter filamentis ſtriato; velo deſtitutus, ſed annulo ſpurio notatus. *Bauaros* nomen fugit.

Fig. I. Fungus parum euolutus, quoad faciem inferiorem, vbique annulus ſpurius maxime adparet.

Fig. II. Fungus euolutus; pileo conuexo.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IV. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus multum euolutus; pileo in centro inciſo.

Fig. VI. Fungus paullulum euolutus; pileo conico.

Fig. VII. IIX. Pollen auctus & natiuus.

Erklärung der ſieben und dreyßigſten Kupfertafel.

Der zwey und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein einfärbiger, einfacher, voller, fleiſchiger, wenig veränderlicher Schwamm; mit einem faſeriggeſtrichelten, anfänglich runden, oft kegeligen, nachher gewölbten, Hute; einem runden und faſeriggeſtrichelten Stiele; zwar ohne Saamendecke, aber mit unächtem Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein etwas entwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche, und wo der unächte Ring vornämlich zu erkennen iſt.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Ringe.

Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.

Fig. V. Ein ſtark entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten eingeſchnittenen Hute.

Fig. VI. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.

Fig. VII. IIX. Der vergrößerte und natürliche Saamenſtaub.


Tab. XXXVII.
Fig. II.
Fig. I.
Fig. VIII.
Fig. VII.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS TRICESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus bicolor, & ſimplex & multiplex, farctus, carnoſus, per aetatem varius; pileo ſtriato, ab initio fere ſphaerico, poſt conuexo; petiolo rotundo, ſtriis variegato & colorato; velo deſtitutus, ſed annulo ſpurio ſignatus. *Bauari* nomen habent nullum.


Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo ſphaerico.
Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Faſciculus fungorum, variae figurae & explicatioins.
Fig. V. Par fungorum, pileis connatorum.
Fig. VI. Trias fungorum, peculiaris ſitus.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. IIX. Pollen lente auctus.

Erklärung der acht und dreyßigſten Kupfertafel.

Der drey und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein zweyfärbiger, theils einzelner, theils vielfacher, voller, fleiſchiger, und mit der Zeit veränderlicher Schwamm; mit einem geſtrichelten, anfänglich kugelrunden, nachher gewölbten, Hute; einem runden, ſchön geſtrichelten und gefärbten, Stiele; ohne Saamendecke, aber mit einem unächten Ringe. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwam̃, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Ein Büſchel Schwämme, von verſchiedener Figur und Entwickelung.
Fig. V. Ein Paar, mit ihren Hüten zuſammengewachſene, Schwämme.
Fig. VI. Drey Schwämme, von beſonderer Stellung.
Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IIX. Der vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XXXVIII
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. V.
Fig. IV.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE TRICESIMAE NONAE.

AGARICVS TRICESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus vnicolor, & ſolitarius & faſciculoſus, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio conico, ſaepe ſphaerico, poſt conuexo, tandem plano, ac infundibuli forma; petiolo cylindraceo, ad baſin craſſiuſculo; nec velum, nec annulum, habens. Nomen in *Bauaria* datur nullum.

Fig. I. Par fungorum, quorum minor pileum planiuſculum, maior infundibuliformem, habet.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo conuexo.
Fig. III. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Fungus explicatus; pileo plano.
Fig. VI. Fungus nondum explicatus; pileo conico.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & lente auctus.


Erklärung der neun und dreyßigſten Kupfertafel.

Der vier und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein einfärbiger, ſo wohl einzelner, als vielfacher, voller, fleiſchiger, und wenig veränderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegelartigen, oft kugelrunden, nachher gewölbten, zuletzt flachen, oder trichterförmigen, Hute; mit einem runden und unten dicken Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere mit einem flachen, der gröſſere mit einem trichterförmigen, Hute verſehen iſt.
Fig. II. Ein entwickelter Schwam̃; mit gewölbtem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.
Fig. VI. Ein unentwickelter Schwamm; mit kegelförmigem Hute.
Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Tab. XXXIX.



St. Loibel pinx. Ratisb. Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE.

AGARICVS TRICESIMVS QVINTVS.

Est fungus bicolor, seu tricolor, & simplex & multiplex, intrinsecus paullulum cauus, carnosus, parum varius; pileo punctato, ab initio conuexo, post plano; petiolo striato, cylindraceo, ad basin crassiusculo, & saepissime colorato; nec velum, nec annulum, habens. *Bauari* nomen nesciunt.


Fig. I. Fungus euolutus; pileo conuexo.
Fig. II. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo plano.
Fig. IV. Fasciculus fungorum; pileis conuexis & quasi oualibus.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.
Fig. VI. Pollen natiuus.
Fig. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der vierzigsten Kupfertafel.

Der fünf und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist ein zweyfärbiger, oder dreyfärbiger, so wohl einfacher, als vielfacher, innwendig etwas hohler, fleischiger, und wenig veränderlicher Schwamm; mit einem gedippelten, anfangs gewölbten, nachher flachen, Hute; mit einem gestrichelten, runden, unten dickern, und oft gefärbten, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.
Fig. IV. Ein Büschel Schwämme; mit gewölbten, und gleichsam eyrunden, Hüten.
Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. VI. Der natürliche Saamenstaub.
Fig. VII. Der vergrösserte Saamenstaub.


Tab. XL.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS TRICESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus bicolor, vel tricolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo granulato, ab initio ſphaerico, poſt conuexo, ſeu conico, tandem planiuſculo, ſaepe deformi; petiolo cylindraceo, ad baſin ſaepe craſſiuſculo ſeu tuberoſo; tam velo, quam annulo, orbatus. *Bauaris* nomen latet.


Fig. I. Fungus euolutus; pileo conuexo, in centro ſulcato.
Fig. II. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Fungus euolutus; petiolo ſtriis notato.
Fig. V. Fungus explicari incipiens; petiolo tuberoſo.
Fig. VI. Fungus euolutus; pileo deformi.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. IIX. Pollen vitro auctus.

Erklärung der ein und vierzigſten Kupfertafel.

Der ſechs und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein zweyfärbiger, oder dreyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, und wenig veränderlicher, Schwamm; mit einem chagrinartigen, anfänglich runden, oft gewölbten, oder kegelähnlichen, zuletzt flachen, oft unförmlichen, Hute; einem runden, und unten oft dickern, oder knolligen, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwam̃; mit gewölbtem, und in der Mitten gefurchtem, Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit geſtricheltem Stiele.
Fig. V. Ein ſich entwickelnder Schwamm; mit knolligem Stiele.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit ungeſtaltetem Hute.
Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IIX. Der vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. XLI.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS TRICESIMVS SEPTIMVS.

Est fungus tricolor, plerumque solitarius, farctus, carnosus, parum varius; pileo ab initio conuexo, post plano; petiolo vel crasso, vel tenuiori, ad basin tamen semper crassiori, ac saepe tuberoso; velo araneoso, sed annulo nullo. In *Bauaria* nomen desideratur.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; petiolo tuberoso.

Fig. II. Par fungorum; quorum maior pileum deformem gerit, minor nondum euolutus est.

Fig. III. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen auctus.

Erklärung der zwey und vierzigsten Kupfertafel.

Der sieben und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist ein dreyfärbiger, meistentheils einzelner, voller, fleischiger, und wenig veränderlicher, Schwamm; mit einem anfängs gewölbten, nachher flachen, Hute; einem entweder dicken, oder dünnern, jedoch nach unten zu allezeit dickern, und oft knolligen, Stiele; mit einer spinnenwebigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit knolligem Hute.


Fig. II. Ein Paar Schwämme; davon der grössere einen ungestalteten Hut hat, der kleinere aber noch unentwickelt ist.

Fig. III. Ein entwickelter Schwam̃, nach seiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrösserte Saamenstaub.


Tab. XLII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE TERTIAE.

AGARICVS TRICESIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus, ex loco natali, lignarius, bicolor, & ſimplex & multiplex, praeter petiolum non carnoſus, paullulum tremulans, omnium maxime varius; pileolo figurae ſingularis, incertiſſimae, fere ſemper alius, ſaepius deformis; petiolo breui, ſaepe vix vllo; tam velum, quam annulus, deficit. In *Bauaria* nomine inſignitur nullo.


Fig. I. Fungus euolutus; pileo alectorolophoideo, ſeu criſtam galli referente.
Fig. II. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. III. Fungus alectorolophoides minor.
Fig. IV. Fungus euolutus; quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen lente auctus.

Erklärung der drey und vierzigſten Kupfertafel.

Der acht und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſo wohl einfacher, als vielfacher, auſſer dem Stiele gar nicht fleiſchiger, ganz ungemein abänderlicher Zitterſchwamm, und, vermöge ſeines Geburthorthes, ſo nannter Holzſchwamm; mit einem ſonderbaren, ſehr unbeſtimmten, faſt allezeit andern, und ſehr oft unförmlich geſtalteten, Hute; entweder mit einem kurzen, oder mit gar keinem, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem hahnenkammigen Hute.
Fig. II. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. III. Ein kleinerer hahnenkammiger Schwamm.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. XLIII
Fig. VI.
Fig. I.
Fig. V.
Fig. II.
Fig. IV.
Fig. III.
St. Loibel pinx. Rat.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE QVARTAE.

VARIETATES AGARICI TRICESIMI OCTAVI.

Ne quis praecedentis agarici varietates, fere innumeras, pro diuersis habeat speciebus; operae pretium duxi quibusdam singularibus hanc tabulam dicare.

Fig. I. Fungus maior; pileo florem irregularem & quadrifidum aemulante.

Fig. II. Fungus deformis; pileo petalum irregulare, & ora laceratum, referente.

Fig. III. Fungus singularis; cuius pileus floris petalo cordiformi respondet.

Fig. IV. Fasciculus fungorum; quorum medii & pileis & petiolis sunt connati, dexter ad florem linguiformem accedit.

Erklärung der vier und vierzigsten Kupfertafel.

Abänderungen des acht und dreyßigsten Blätterschwammes.


Damit niemand die, fast unzählbaren, Abänderungen des vorhergehenden Schwammes, vor so viel eigene und besondere Gattungen ansehen möge; so habe ich es für nöthig erachtet, einige dieser Abänderungen auf dieser Tafel vorzustellen.

Fig. I. Ein grosser Schwam̃; mit einem unförmlichen, blumenähnligen, und gleichsam vierfach eingeschnittenen, Hute.

Fig. II. Ein ungestalteter Schwamm; dessen Hut einem unförmlichen, und am Rande zerrissenen, Blumenblatte gleichet.

Fig. III. Ein sonderbarer Schwamm; dessen Hut einem herzförmigen Blumenblatte beykommet.

Fig. IV. Ein Büschel Schwämme; davon die mittlern, so wohl den Hüten, als Stielen nach, zusammengewachsen sind; der zur rechten Seite aber ein zungenähnliches Blumenblatt vorstellet.


Tab. XLIV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE QVINTAE.

AGARICVS TRICESIMVS NONVS.

Est fungus bicolor, & solitarius & fasciculosus, cauus, parum carnosus, parumque varius; pileo conuexo, in centro saepe, vel paullulum fastigiato, vel quasi truncato, & in ambitu tenuissime striato; petiolo tenuiori, rotundo, ad basin crassiusculo, saepe rostrato seu globoso; velo ac annulo carens. Apud *Bauaros* nomen est nullum.

Fig. I. Fasciculus fungorum, multa aqua imbutorum; pileis conuexis ac in centro paullulum fastigiatis.

Fig. II. Fungus euolutus; petiolo rostrato.

Fig. III. Fungus euolutus; pileo in centro quasi truncato; petioli radice repente & globosa.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.

Fig. VI. VII. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der fünf und vierzigsten Kupfertafel.

Der neun und dreyßigste Blätterschwamm.

Es ist ein zweyfärbiger, so wohl einzelner, als vielfacher, hohler, etwas fleischiger, und wenig veränderlicher Schwamm; mit einem gewölbten, in der Mitten vielmals erhabenen, oder abgestutzten, und am Rande zartgestrichelten, Hute; mit einem zarten, runden, und unten etwas dickern, schnabelähnlichen, oder kugelrunden, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel, vom Wasser stark angesaugter, Schwämme; mit gewölbtem, und in der Mitten etwas erhabenem, Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwam̃; mit schnabelähnlichem Stiele.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten gleichsam abgestutzten Hute; und mit einer kriegenden und runden Wurzel.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; nach seiner Unterfläche.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.


Tab. XLV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
St. Lowbel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

AGARICVS QVADRAGESIMVS.

Eſt fungus hydrophorus, bicolor, ſolitarius, fiſtuloſus, carne deſtitutus, per aetatem varius; pileo ab initio fuſiformi, poſt conico, denique variis modis ad oram lacerato, reuoluto & deformi, ſemper villis ſquamoſo, ac lineolis ſecundum longitudinem exarato, nec non porcellanarum in modum verſicolori; petiolo cylindraceo, radice curuata ſeu roſtrata; velo deſtitutus, annulo vel ſpurio, vel nullo, praeditus. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo fuſiformi.
Fig. II. Fungus explicari incipiens; petiolo annulo ſpurio ornato.
Fig. III. Fungus paullulum euolutus; pileo porcellanarum in modum verſicolori; petiolo roſtrato, ſed annulo deſtituto.

Erklärung der ſechs und vierzigſten Kupfertafel.

Der vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein zweyfärbiger, einzelner, hohler, unfleiſchiger, und mit der Zeit abänderlicher Waſſer- und Miſtſchwamm; mit einem anfänglich ſpindelförmigen, nachher kegelähnlichen, und zuletzt am Rande auf mancherley Weiſe zerriſſenen, aufgerollten und ungeſtalteten, allezeit aber zottigſchuppigen, und langgeſtrichelten, ſonderlich aber porcellanfärbigen, Hute; mit rundem, an der Wurzel gekrümmtem, oder ſchnabelähnlichem, Stiele; ohne Saamendecke, und entweder ohne Ring, oder mit einem Afterringe. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein unentwickelter Schwamm; mit ſpindelförmigem Hute.
Fig. II. Ein ſich entwickelnder Schwamm; mit einem Afterringe am Stiele.
Fig. III. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit einem ſchönfärbigen und porcellanähnlichen Hute; mit einem ſchnabelähnlichen Stiele und Afterringe.


Tab. XLVI.
Fig. II.
Fig. I.
Fig. III.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE SEPTIMAE.

VARIETATES ET POLLEN AGARICI QVADRAGESIMI.

Quia agarici praecedentis pileus, ex natura plerorumque hydrophororum, per aetatem in atramentum resoluitur, non possunt non exinde innumerae oriri varietates; vti ex huius tabulae iconibus quodammodo videre licet.

Fig. I. Fungus paullulum euolutus; pileo villis squamoso, lineolisque secundum longitudinem ornato; petiolo annulo carente.

Fig. II. Fungus deformis; pileo in atramentum defluente, & maxima iam parte resoluto.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der sieben und vierzigsten Kupfertafel.

Abänderungen und Saamenstaub des vierzigsten Blätterschwammes.

Da der Hut des vorhergehenden Blätterschwammes, nach Art der meisten Wasserschwämme, mit der Zeit in ein dintenartiges Wasser aufgelöset wird; so kan es nicht wohl anders seyn, als daß von daher unendlich viele Abänderungen entstehen müssen. Die Abbildungen dieser Tafel können solches einigermassen begreiflich machen.

Fig. I. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit einem zottigschuppigen, und nach der Länge gezogenen Strichen gezierten, Hute; und einem Stiele ohne Ring.

Fig. II. Ein ungestalteter Schwamm; mit einem in Dintenwasser abfliessenden, und zum Theil darinnen schon aufgelöseten, Hute.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. V. Der vergrösserte Saamenstaub.


Tab. XLVII.
Fig. III.
Fig. II.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. I.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS QVADRAGESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus, ex loco natali, lignarius, ſericeus, tricolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, valde varius; pileo ſaepius deformi, modo conico, modo campaniformi, modo conuexo, vel laeui, vel punctato, vel ſubtiliſſime granulato, ad oram ſeu integro, ſeu inciſo, plerumque tenuiſſime ſtriato; petiolo cylindraceo, tortili, & ad baſin craſſiori; nec velum, nec annulum, habens. *Bauaris* nomen eſt nullum.

Fig. I. Fungus euolutus; pileo conico, punctato & in ambitu quadrifido.

Fig. II. Fungus euolutus; pileo campaniformi, granulato, ad oram ſtriato.

Fig. III. Fungus deformis; pileo triangulari, in centro mammoſo, & in ambitu ſtriato.

Fig. IV. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VI. Fungus euolutus; pileo faſciato & ſtriato.

Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der acht und vierzigſten Kupfertafel.

Der ein und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein dreyfärbiger, einzelner, voller, ſehr wenig fleiſchiger, ſehr abänderlicher Seidenſchwamm, und, nach ſeinem Geburthsorthe, ein ſo genannter Holzſchwamm; mit einem ſehr oft ungeſtalteten, bald kegeligen, bald glockigen, bald gewölbten, entweder glatten, oder gedippelten, oder ſehr zart knopperigen, am Rande ganzen, oder eingeſchittenen, insgemein zartgeſtrichelten, Hute; mit einem runden, gewundenen und unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwam̃; mit kegeligem, gedippeltem, und am Rande vierfach geſpaltenem, Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem, knopperigem, und am Rande geſtricheltem, Hute.


Fig. III. Ein ungeſtalteter Schwamm; mit dreyeckigem, in der Mitten warzigem, und am Rande geſtricheltem, Hute.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.

Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VI. Ein entwickelter Schwam̃; mit bandförmigem und geſtricheltem Hute.

Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XLVIII.
Fig. VII.
Fig. III.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. VIII.
Fig. VI.
Fig. V.
Fig. IV.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVADRAGESIMAE NONAE.

AGARICVS QVADRAGESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus bicolor, vel tricolor, plerumque multiplex, cauus, vix carnoſus, varius; pileo ab initio vel globoſo, vel conico, poſt plano, ſaepe deformi; petiolo cylindraceo, ac plerumque ſtriis notato; velo ab initio membranaceo, poſt araneoſo, ſed annulo nullo. *Bauaris* nomen latet.

Fig. I. Faſciculus fungorum, variae figurae & explicationis.
Fig. II. Fungus nondum euolutus; petiolo quaſi radicato; velo araneoſo.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Par fungorum explicatorum; pileis conicis.
Fig. V. Par fungorum nondum explicatorum; pileis globoſis.
Fig. VI. Trias fungorum; quorum maior euolutus, pileo plano; minores euolui incipiunt, velis membranaceis.
Fig. VII. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der neun und vierzigſten Kupfertafel.

Der zwey und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger und dreyfärbiger, meiſtentheils vielfacher, hohler, faſt gar nicht fleiſchiger, abänderlicher, Schwam̃; mit einem anfangs entweder kugelrunden, oder kegeligen, nachher flachen, oft unförmlichen, Hute; mit einem runden, und meiſtens geſtrichelten, Stiele; mit einer anfangs häutigen, nachher ſpinnenwebigen, Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel Schwämme; von verſchiedener Geſtalt und Entwickelung.
Fig. II. Ein unentwickelter Schwamm; mit einem Wurzelſtiele und einer ſpinnenwebigen Saamendecke.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Ein Paar entwickelte Schwämme; mit kegeligen Hüten.
Fig. V. Ein Paar unentwickelte Schwämme; mit kugelrunden Hüten.
Fig. VI. Drey Schwämme; davon der gröſſere entwickelt iſt, mit flachem Hute; die kleinen ſich zu entwickeln anfangen, mit häutigen Saamendecken.
Fig. VII. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XLIX.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE.

AGARICVS QVADRAGESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus vnicolor, ſimplex & multiplex, farctus, carnoſus, varius; pileo conico, vel rotundo, ſaepiſſime deformi; petiolo cylindraceo, ad baſin craſſiori, ſaepe adpendiculo radiciformi praedito; velo & annulo orbatus. *Bauaris* nomen eſt nullum.

Fig. I. Trias fungorum, variae figurae.

Fig. II. Fungus euolutus, multa aqua imbutus; pileo fiſſo.

Fig. III. Par fungorum; pileis deformibus; quibusque aliud par minorum adnatum eſt.

Fig. IV. Faſciculus fungorum; quorum medii pileis connati ſunt, minor pileum haemiſphaericum gerit.

Fig. V. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VII. Fungus euolutus; pileo conico; petiolo adpendiculato.

Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der funfzigſten Kupfertafel.

Der drey und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, ſo wohl einfacher, als vielfacher, voller, fleiſchiger, und veränderlicher, Schwamm; mit einem kegeligen, oder runden, ſehr oft ungeſtalteten, Hute; mit einem runden, und unten dickern, Stiele, und an welchem ſich oft ein wurzelähnlicher Anhang befindet; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Drey Schwämme, von verſchiedener Geſtalt.

Fig. II. Ein entwickelter, und ſtark mit Waſſer angeſaugter, Schwamm; mit geſpaltenem Hute.

Fig. III. Ein Paar Schwämme; mit ungeſtalteten Hüten; und welchen unten ein Paar kleinere Schwämme angewachſen ſind.


Fig. IV. Ein Büſchel Schwämme; davon die mittlern mit ihren Hüten zuſammengewachſen ſind, und der kleinere einen halbrunden Hut hat.

Fig. V. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.

Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VII. Ein entwickelter Schwamm; mit kegelähnlichem Hute; und einem Stiele mit einem Anhang.

Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. I.
Fig. II.
Fig. I.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS QVADRAGESIMVS QVARTVS.

Est fungus tricolor, solitarius, farctus, parum carnosus, parumque varius; pileo ab initio conico, post campanulato; petiolo cylindraceo, varie saepius deflexo, ad basin crassiusculo & tuberculoso; velo araneoso, annuloque teneriori, praeditus. *Bauaris* nomen est nullum.


Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo conico.
Fig. II. Fungus euolutus; pileo campaniformi.
Fig. III. Fungus euolutus; sed exsiccatus.
Fig. IV. Fungus explicatus, iam exsiccatus, sed nimia pluuia denuo intumescens.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.
Fig. VI. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. VII. Fungus exsiccatus; pileo deformi.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus.
Fig. X. XI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der ein und funfzigsten Kupfertafel.

Der vier und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, einzelner, voller, wenig fleischiger, und wenig veränderlicher, Schwam̃; mit einem anfangs kegeligen, nachher glockigen, Hute; einem runden, oft auf mancherley Art geschlängelten, unten dickern und knolligen, Stiele; mit einer spinnenwebigen Saamendecke, und einem zarten Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein unentwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter, aber ausgetrockneter, Schwamm.
Fig. IV. Ein schon dürr gewesener Schwamm; der aber bey häufigem Regen fast gänzlich wieder aufgeschwollen ist.
Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. VI. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.
Fig. VII. Ein dürrer Schwamm; mit unförmlichem Hute.
Fig. IIX. IX. Der natürliche Saamenstaub.
Fig. X. XI. Der vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LI.
Fig. I.
Fig. IX.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. XI.
Fig. X.
Soph. Beezin pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS QVADRAGESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus hydrophorus, &, ex loco natali, lignarius, bicolor, & ſolitarius & faſciculoſus, cauus, carne deſtitutus, parum varius; pileo ab initio conico, poſt vel campanulato, vel plano, in centro faſtigiato & in ambitu ſtriato, ſeu plicato; petiolo cylindraceo, tenuiori & fragili; velo & annulo orbatus. In *Bauaria* nomine caret.

Fig. I. Faſciculus fungorum, fruſtulo ligni innatorum. Fig. II. Trias fungorum, nondum euolutorum, minorum. Fig. III. IV. Par fungorum, & pileis, & petiolis, connatorum. Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus. Fig. VI. Fungus euolutus; pileo campanulato, in centro faſtigiato. Fig. VII. Fungus maior, euolutus; pileo campanulato, in margine ſtriato. Fig. IIX. Fungus maior, euolutus; petiolo ad baſin craſſiuſculo & tuberoſo. Fig. IX. Fungus explicatus; pileo plano, in centro faſtigiato. Fig. X. XI. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zwey und funfzigſten Kupfertafel.

Der fünf und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſo wohl einzelner, als vielfacher, hohler, unfleiſchiger, wenig veränderlicher, Waſſerſchwam̃, und, vermöge ſeines Geburthortһes, ein ſo genannter Holzſchwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachher entweder glockigen, oder flachen, in der Mitten zugeſpitzten, und am Rande geſtrichelten, oder gefaltenen, Hute; mit einem runden, zarten und zerbrechlichen Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel Schwäm̃e, wie ſie einem Stückgen Holze aufſitzen. Fig. II. Drey noch unentwickelte kleine Schwämme. Fig. III. IV. Ein Paar Schwämme, welche mit ihren Stielen und Hüten zuſammengewachſen ſind. Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm. Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem und in der Mitten zugeſpitztem Hute. Fig. VII. Ein groſſer entwickelter Schwamm; mit glockigem und am Rande geſtricheltem Hute. Fig. IIX. Ein groſſer entwickelter Schwamm; mit einem unten dickern und knolligen Stiele. Fig. IX. Ein entwickelter Schwam̃; mit flachem und in der Mitten zugeſpitztem Hute. Fig. X. XI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.



Tab. LII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. X.
Fig. XI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE TERTIAE.

AGARICVS QVADRAGESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus bicolor, plerumque ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio globoſo, poſt hemiſphaerico ſeu conuexo; petiolo craſſiori & ad baſin tuberoſo; velo araneoſo, ſed annulo nullo. Nomen in *Bauaria* deſideratur.

Fig. I. Par fungorum, quorum minor nondum euolutus, maior pileum deformem gerit.

Fig. II. Fungus nondum euolutus, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus euolutus, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. V. Fungus maxima iam parte quidem euolutus, ſed velo araneoſo adhuc donatus.

Fig. VI. Fungus euolutus; pileo conuexo & decolori.

Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der drey und funfzigſten Kupfertafel.

Der ſechs und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, insgemein einfacher, voller, fleiſchiger, und wenig veränderlicher, Schwam̃; mit einem anfangs kugelrunden, nachher halbrunden, oder gewölbten, Hute; mit einem unten dickern und knolligen Stiele; mit einer ſpinnenwebigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere noch unentwickelt iſt, der gröſſere einen unförmlichen Hut hat.

Fig. II. Ein noch unentwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.


Fig. III. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. V. Ein Schwamm, welcher zwar meiſtentheils ſich entwickelt hat, an dem aber gleichwohl die ſpinnenwebige Saamendecke noch befindlich iſt.

Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute, und von abgeſchoſſener Farbe.

Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.



St. Loibel pinx. Ratisb. Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE QVARTAE.

AGARICVS QVADRAGESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus bicolor, & fere vnicolor, plerumque ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio globoſo, poſt conuexo; petiolo vel craſſiori vel tenuiori, ſemper tuberoſo; velo araneoſo, ſed annulo nullo. In *Bauaria* nomen deficit.


Fig. I. Par fungorum, nondum explicatorum; petiolis connatis.
Fig. II. Fungus euolutus; pileo conuexo.
Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus nondum euolutus; cuius petioli baſi par minorum adnatum eſt.
Fig. V. Fungus nondum euolutus; pileo deformi.
Fig. VI. Fungus nondum euolutus, multa aqua imbutus.
Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der vier und funfzigſten Kupfertafel.

Der ſieben und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, und faſt einfärbiger, meiſtentheils einzelner, voller, fleiſchiger, und wenig veränderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachher gewölbten, Hute; mit einem bald dickern, bald dünnern, allezeit aber knolligen, Stiele; einer ſpinnenwebigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar noch unentwickelte Schwämme; mit zuſammengewachſenen Stielen.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute.
Fig. III. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm; an deſſen Stiele ſich unten ein Paar andere und kleinere befinden.
Fig. V. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit ungeſtaltetem Hute.
Fig. VI. Ein noch unentwickelter, und ſtark mit Waſſer angeſaugter, Schwam̃.
Fig. VII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. LIV.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE QVINTAE.

AGARICVS QVADRAGESIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus bicolor, fere vnicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio conico, poſt conuexo, tandem plano, ſaepe infundibuliformi; petiolo cylindraceo, ad baſin ſaepe curuato & acuto; velo araneoſo, ſed annulo priuatus. Nomen *Bauari* norunt nullum.

Fig. I. Fungus minor, nondum euolutus; petiolo curuato & acuto.
Fig. II. Fungus maior, ſe explicare incipiens; petiolo pariter curuato & acuto.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Fungus explicatus; pileo conuexo & decolorato.
Fig. V. Fungus explicatus; pileo plano, in formam infundibuli tranſeunte.
Fig. VI. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.
Fig. VII. Fungus euolutus; pileo in margine, floris ad inſtar, exciſo.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der fünf und funfzigſten Kupfertafel.

Der acht und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, und beynahe einfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger und veränderlicher, Schwam̃; mit einem anfangs kegeligen, nachher gewölbten, und endlich flachen, oder trichterförmigen, Hute; mit einem runden, unten oft gekrüm̃ten und zugeſpitzten, Stiele; mit ſpinnenwebiger Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein kleiner, noch unentwickelter Schwam̃; mit gekrümmtem und zugeſpitztem Stiele.
Fig. II. Ein gröſſerer ſich entwickelnder Schwam̃; mit gleichfalls gekrümmtem und zugeſpitztem Stiele.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem und abfärbigem Hute.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit einem flachen und trichterförmig werdenden Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VII. Ein entwickelter Schwamm; mit einem am Rande blumenartig ausgeſchnittenen Hute.
Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.



St. Loibel pinx. Ratisb. G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE SEXTAE.

AGARICVS QVADRAGESIMVS NONVS.

Eſt fungus bicolor, fere ſemper ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ante explicationem globoſo, poſt conuexo ſeu hemiſphaerico; petiolo craſſo & valde tuberoſo; velo araneoſo, ſed annulo nullo. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo exiguo, quoad magnitudinem, a petiolo valde diſſentiente.

Fig. II. Fungus nondum euolutus; pileo decolorato.

Fig. III. Fungus nondum explicatus, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IV. Fungus explicatus; pileo conuexo; cuiusque petioli baſis pluribus minoribus & deformibus circumdata eſt.

Fig. V. Fungus nondum explicatus; pileo colorato, & acu quaſi compuncto.

Fig. VI. Fungus euolui incipiens, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VII. Fungus explicatus, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der sechs und funfzigsten Kupfertafel.

Der neun und vierzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fast allezeit einzelner, voller, fleischiger, wenig veränderlicher, Schwam̃; mit einem, vor der Entwickelung, kugelrunden, nachher gewölbten, oder halbrunden, Hute; mit einem dicken und stark knolligen Stiele; einer spinnenwebigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwam̃; mit einem, in Ansehung des Stieles, sehr ungewöhnlich kleinen Hute.

Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit abfärbigem Hute.

Fig. III. Ein noch unentwickelter und senkrecht zerschnittener Schwamm.


Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit gewölbtem Hute; und dessen Stiel unten mit mehrern kleinern und unförmlichen umgeben ist.

Fig. V. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit gefärbtem, und gleichsam mit einer Nadel gedippetem, Hute.

Fig. VI. Ein sich entwickelnder und senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. VII. Ein entwickelter und senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LVI.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
S. Beezin pinx. Rat.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS QVINQVAGESIMVS.

Eſt fungus, tam, quoad locum natalem, lignarius, quam, quoad fabricam, vere & totus lignoſus, vnicolor, hirſutie piloſus, non putreſcens; pileo ſemicirculari, plano, ſaepe deformi, in margine concinnis circulis prominente & eleganter ſtriato; lamellis duris & inordinate connatis; petiolo, velo, annulo, & nomine *Bauarico*, orbatus.

Fig. I. Fungus explicatus, fruſtulo ligni innatus; pileo ſemicirculari.
Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus pileo deformi.
Fig. IV. Fungus ſingularis figurae.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der ſieben und funfzigſten Kupfertafel.

Der funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, rauchhaariger, unverweßlicher, und, ſo wohl in Anſehung ſeines Geburthorthes, als ſeines innern Gewebes, ein eigentlicher und vollkommener Holzſchwam̃; mit einem halbrunden, flachen, oft ungeſtalteten, und am Rande mit ſehr artigen, aufgeworfenen und ſchön geſtrichelten Ringen gezierten, Hute; mit harten und unordentlich zuſammengewachſenen Saamenblättern; aber ohne Stiel, ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein ausgebreiteter Schwamm; mit halbcirkelrundem Hute, und wie er einem Stückgen Holze anſitzet.
Fig. II. Eben dieſer Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein Schwamm, mit ungeſtaltetem Hute.
Fig. IV. Ein Schwamm, von ſonderbarer Bildung.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergrösserte Saamenſtaub.


Tab. LVII.
Fig. I.
Fig. III.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. II.
Fig. IV.
Soph. Bezin pinx. Ratisb.
A. L. Wirsing sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS QVINQVAGESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt conuexo, denique infundibuliformi, ſubtiliter punctato; petiolo craſſo, ad baſin ſaepe tuberoſo; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, nullo.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo rotundo.
Fig. II. Fungus explicari incipiens, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus euolutus; pileo infundibulum referente.
Fig. IV. Fungus explicatus; pileo conuexo.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. Pollen natiuus.
Fig. VII. Pollen lente auctus.


Erklärung der acht und funfzigſten Kupfertafel.

Der ein und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, und veränderlicher, Schwam̃; mit einem anfangs kugelrunden, nachher gewölbten, endlich trichterförmigen, und zart gedippelten, Hute; mit einem dicken, und unten ſehr oft knolligen, Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit rundem Hute.
Fig. II. Ein ſich entwickelnder Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit trichterförmigem Hute.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VII. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Tab. LVIII.



Soph. Beezin pinx. Ratisb.

Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE QVINQVAGESIMAE NONAE.

AGARICVS QVINQVAGESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus ex minoribus, bicolor, ſimplex, farctus, carne deſtitutus, valde varius; pileo multiformi & fere ſemper alio; petiolo tenuiori, varie plerumque flexo, ſaepe radicato; nec velo, nec annulo donatus. *Bauaros* nomen fugit.


Fig. I. Fungus euolutus; pileo plano, in centro papillato. Fig. II. Fungus euolutus; pileo conuexo. Fig. III. Fungus parum euolutus; pileo plicato. Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus. Fig. V. Fungus explicatus; pileo florem aemulante; petiolo radicato. Fig. VI. Fungus euolutus; pileo ſolis imaginem referente. Fig. VII. Fungus quoad faciem inferiorem. Fig. IIX. Fungus euolutus; pileo radiato. Fig. IX. Fungus nondum explicatus; pileo rotundo. Fig. X. Fungus multa aqua imbutus, quoad faciem inferiorem. Fig. XI. XII. Pollen natiuus. Fig. XIII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der neun und funfzigſten Kupfertafel.

Der zwey und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein kleiner, zweyfärbiger, einfacher, voller, unfleiſchiger, ſehr veränderlicher, Schwam̃; mit einem vielförmigen, und faſt allezeit anders geſtalteten, Hute; mit einem dünnen, insgemein auf mancherley Art gebogenen, und ſehr oft wurzelhaften, Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwam̃; mit flachem und in der Mitten warzigem Hute. Fig. II. Ein entwickelter Schwam̃; mit gewölbtem Hute. Fig. III. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit gefaltenem Hute. Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm. Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit blumenartigem Hute, und wurzelhaftem Stiele. Fig. VI. Ein entwickelter Schwam̃; mit ſonnenähnlichem Hute. Fig. VII. Ein Schwam̃ nach ſeiner Unterfläche. Fig. IIX. Ein entwickelter Schwamm; mit geſtrahltem Hute. Fig. IX. Ein unentwickelter Schwamm; mit rundem Hute. Fig. X. Ein vom Waſſer ſtark geſchwängerter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche. Fig. XI. XII. Der natürliche Saamenſtaub. Fig. XIII. Der vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. LIX.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. X.
Fig. XI.
Fig. XII.
Fig. XIII.
Soph. Beezin pinx. Ratisb.
G. P. Nussbiegel sc. Norimb.

AGARICVS QVINQVAGESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus tricolor, & ſimplex & multiplex, cauus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio conico, poſt campanulato, denique plano; petiolo cylindraceo, ad baſin craſſiuſculo; nec velum, nec annulum habens. *Bauari* nomen neſciunt.


Fig. I. Par fungorum explicatorum; petiolis ad baſin connatis.
Fig. II. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Faſciculus fungorum euolutorum.
Fig. V. Fungus multa aqua imbutus.
Fig. VI. Fungus exſiccatus; pileo conuexo, in centro faſtigiato.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. IIX. Pollen vitro auctus.

Erklärung der sechzigsten Kupfertafel.

Der drey und funfzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, so wohl einfacher, als vielfacher, hohler, unfleischiger, wenig veränderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachher glockigen, zuletzt flachen, Hute; mit einem runden und unten dickern Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar entwickelte Schwämme; mit unten zusammengewachsenen Stielen.
Fig. II. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. III. Ein Schwamm nach seiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein Büschel entwickelter Schwämme.
Fig. V. Ein mit Wasser geschwängerter Schwamm.
Fig. VI. Ein ausgetrockneter Schwamm; mit gewölbtem und in der Mitten zugespitztem Hute.
Fig. VII. Der natürliche Saamenstaub.
Fig. IIX. Der vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LX.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
St Loibel pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS QVINQVAGESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus bicolor, tam ſolitarius, quam faſciculoſus, farctus, carnoſus, varius; pileo piloſo-ſquamoſo, ab initio conico, poſt vel campanulato & in centro faſtigiato, vel plano; petiolo pariter piloſo-ſquamoſo, modo ſupra, modo infra, craſſiori; velo nullo, ſed annulo ſpurio. Nomine in *Bauaria* inſignitur nullo.


Fig. I. Faſciculus fungorum nondum explicatorum, diuerſae magnitudinis.
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Fungus euolutus; pileo plano, in centro faſtigiato.
Fig. V. Fungus explicatus; pileo campanulato, in centro faſtigiato.
Fig. VI. Fungus explicatus; pileo conuexo.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. IIX. Pollen lente auctus.

Erklärung der ein und sechzigsten Kupfertafel.

Der vier und funfzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, so wohl einzelner, als büscheliger, voller, fleischiger, veränderlicher, Schwamm; mit einem haarig-schuppigen, anfangs kegeligen, nachher entweder glockigen und in der Mitten zugespitzten, oder flachen, Hute; mit ebenfalls haarig-schuppigen, bald oben, bald unten, dickern Stiele; ohne Saamendecke; aber mit einem Afterringe. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel unentwickelter Schwämme, von verschiedener Grösse.
Fig. II. Ein Schwamm, nach seiner Unterfläche.
Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwam̃; mit flachem und in der Mitten zugespitztem Hute.
Fig. V. Ein entwickelter Schwam̃; mit glockigem und in der Mitten zugespitztem Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.
Fig. VII. Der natürliche Saamenstaub.
Fig. IIX. Der vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LXI.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS QVINQVAGESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus bicolor, fere tricolor, & ſimplex & multiplex, farctus, vix carnoſus, varius; pileo ante explicationem conico, poſt eam campanulato, vel plano, ſemper ſubtiliter ſquamoſo; petiolo plerumque tuberoſo & parum ſtriato; velo membranaceo, ſed annulo nullo. Nomen in *Bauaria* deficit.

Fig. I. Trias fungorum, nondum explicatorum; baſi connexorum.
Fig. II. Fungus nondum euolutus; vbi velum membranaceum maxime conſpicuum.
Fig. III. Par fungorum minorum, baſi connatorum.
Fig. IV. Fungus euolutus; quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Fungus euolutus; pileo conico ſeu campanulato.
Fig. VI. Fungus euolutus; pileo conuexo, in centro depreſſo & in ambitu quaſi plicato.
Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zwey und sechzigsten Kupfertafel.

Der fünf und funfzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fast dreyfärbiger, so wohl einfacher, als vielfacher, voller, fast gar nicht fleischiger, veränderlicher, Schwam̃; mit einem vor der Entwickelung kegeligen, nach derselben glockigen, oder flachen, allezeit zartschuppigen, Hute; mit einem insgemein knolligen, und etwas gestrichelten, Stiele; mit einer häutigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Drey noch unentwickelte, und unten zusammengewachsene, Schwämme.
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; wo die häutige Saamendecke sonderlich zu sehen ist.
Fig. III. Ein Paar kleinere, und unten zusammengewachsene, Schwämme.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; nach seiner Unterfläche.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem oder glockigem Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem, in der Mitten vertieftem, und am Rande gefaltenem, Hute.
Fig. VII. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LXII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IX.
Fig. VIII.
Fig. VI.
Fig. V.
Fig. IV.
Fig. VII.
St. Lochel pinx. Ratisb.
G. P. Nusbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE TERTIAE.

AGARICVS QVINQVAGESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus ex minoribus, vnicolor, plerumque ſimplex, cauus, non carnoſus, varius; pileo vel conico, vel hemiſphaerico, vel campanulato, laeui vel ſtriato; petiolo gracili & cylindraceo; velo & annulo nullo. Nomen *Bauari* ignorant.


Fig. I. Fungus euolutus; pileo campanulato, in centro papillato. Fig. II. Fungus euolutus; pileo rotunde conico. Fig. III. Idem fungus ad perpendiculum diſſectus. Fig. IV. V. Fungus euolutus; pileo acute conico. Fig. VI. Fungus inuerſus, quoad faciem inferiorem; pileo conico. Fig. VII. Fungus euolutus; pileo campanulato, ad oram ſtriato. Fig. IIX. Par fungorum euolutorum; petiolis infra connatis. Fig. IX. Fungus euolutus, colore emortuo. Fig. X. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem; pileo conuexo. Fig. XI. Fungus euolutus; pileo praeter conſuetudinem minori. Fig. XII. Fungus ad perpendiculum diſſectus. Fig. XIII. XIV. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der drey und sechzigsten Kupfertafel.

Der sechs und funfzigste Blätterschwamm.

Es iſt ſolcher ein kleiner, einfärbiger, meiſt einfacher, hohler, unfleiſchiger, veränderlicher, Schwamm; mit entweder kegeligem, oder halbrundem, oder glockigem, glattem oder geſtricheltem, Hute; mit zartem und rundem Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein unentwickelter Schwamm; mit glockigem und in der Mitten warzigem Hute. Fig. II. Ein Schwamm; mit rundkegeligem Hute. Fig. III. Eben derſelbe Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten. Fig. IV. V. Ein entwickelter Schwam̃; mit ſpitzigkegeligem Hute. Fig. VI. Ein umgekehrter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche; mit kegeligem Hute. Fig. VII. Ein entwickelter Schwam̃; mit glockigem, am Rande geſtricheltem, Hute. Fig. IIX. Ein Paar entwickelte Schwämme; mit unterhalb zuſammengewachſenen Stielen. Fig. IX. Ein entwickelter Schwamm, von abgeſchoſſener Farbe. Fig. X. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche; mit gewölbtem Hute. Fig. XI. Ein entwickelter Schwam̃; mit einem ungewöhnlich kleinem Hute. Fig. XII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm. Fig. XIII. XIV. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.



Tab. LXIII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. XIII.
Fig. XIV.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. X.
Fig. XI.
Fig. XII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE QVARTAE.

AGARICVS QVINQVAGESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus bicolor, & ſimplex & faſciculoſus, non raro ramoſus, farctus, paullulum carnoſus, varius; pileo ab initio conico, poſt campanulato, vel conuexo, ſemper piloſe ſtriato; petiolo cylindraceo, ſaepe ramoſo; velo & annulo orbatus. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. Faſciculus fungorum diuerſae explicationis; quorum quidam petiolis ramoſis.

Fig. II. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus explicatus, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IV. Fungus ramoſus; pileis diuerſae figurae.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen lente auctus.

Erklärung der vier und sechzigsten Kupfertafel.

Der sieben und funfzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, so wohl einzelner, als vielfacher, und nicht selten aestiger, voller, wenig fleischiger, veränderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachher glockigen, oder gewölbten, allezeit haariggestrichelten, Hute; mit rundem, oft aestigem, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedener Entwickelung; und deren einige aestige Stiele haben.


Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. III. Ein entwickelter und senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. IV. Ein aestiger Schwamm; mit verschiedentlich gefaltenen Hüten.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LXIV.
Fig. VI.
Fig. V.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE QVINTAE.

AGARICVS QVINQVAGESIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus bicolor, fere vnicolor, & ſolitarius & faſciculoſus, farctus, carnoſus, varius; pileo ante explicationem rotundiuſculo, poſt hemiſphaerico, denique infundibuliformi; petiolo varie plerumque flexo, ad baſin vel craſſiori, vel tenuiori; nullo velo nulloque annulo. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Faſciculus fungorum, diuerſae explicatonis, directionis & figurae.
Fig. II. III. Fungi explicati; pileis infundibuliformibus.
Fig. IV. Fungus paullulum euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Faſciculus fungorum, variae directionis pileisque tortuoſis.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. Fungus maior, euolutus; pileo plicato & quoad faciem inferiorem.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der fünf und sechzigsten Kupfertafel.

Der acht und funfzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fast einfärbiger, so wohl einfacher, als vielfacher, voller, fleischiger, veränderlicher, Schwam̃; mit einem vor der Entwickelung rundlichen, nachher halbrunden, endlich trichterförmigen, Hute; mit einem auf mancherley Weise gekrümmeten, und unten bald dickern, bald dünnern, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. **Hat in Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel Schwäm̃e, von verschiedener Entwickelung, Richtung und Gestalt.
Fig. II. III. Entwickelte Schwämme; mit trichterförmigen Hüten.
Fig. IV. Ein etwas entwickelter Schwamm; nach seiner Unterfläche.
Fig. V. Ein Büschel Schwämme, von verschiedener Richtung, und mit gekrümmten Stielen.
Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. VII. Ein grosser und entwickelter Schwamm; mit gefaltenem Hute, und nach seiner Unterfläche.
Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.



Tab. LXV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE SEXTAE.

AGARICVS QVINQVAGESIMVS NONVS.

Est fungus hydrophorus, tricolor, plerumque multiplex, fistulosus, non carnosus, valde varius; pileo ab initio conico, integro, striato vel plicato, post campaniformi vel plano, ad oram lacerato seu fisso, saepe reuoluto; petiolo cylindraceo, ad basin crassiusculo; & velo & annulo carens. In *Bauaria* nomen est nullum.


Fig. I. Fasciculus fungorum; variae explicationis & figurae.
Fig. II. Fungus inuersus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum dissectus.
Fig. IV. Fungus maior, explicatus; pileo vmbellato, plicato, in ambitu reuoluto.
Fig. V. Par fungorum explicatorum; pileis conicis, ad oram laceratis.
Fig. VI. Fungus explicatus; pileo conico, ad oram oblique absciso.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der sechs und sechzigsten Kupfertafel.

Der neun und funfzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, meistens vielfacher, hohler, unfleischiger, sehr veränderlicher, Wasserschwamm; mit einem anfangs kegeligen, ganzen, gestrichelten oder gefaltenen, nachher glockigen oder flachen, am Rande zerrissenen oder gespaltenen, oft aufgerollten, Hute; mit einem runden, und unten dicklichen, Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedener Entwickelung und Gestalt.
Fig. II. Ein umgekehrter Schwamm; nach seiner Unterfläche.
Fig. III. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. IV. Ein grösserer entwickelter Schwamm; mit sonnenschirmigem, gefaltenem und am Rande aufgerolltem, Hute.
Fig. V. Ein Paar entwickelte Schwäme; mit kegeligem und am Rande zerrissenem Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem und am Rande schief abgeschnittenem Hute.
Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.



Tab. LXVI.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS SEXAGESIMVS.

Eſt fungus hydrophorus, tricolor, & ſolitarius & multiplex, fiſtuloſus, carne deſtitutus, per aetatem varius; pileo ab initio conico, poſt campaniformi, denique variis modis ad oram lacerato, fiſſo, & non raro reuoluto; petiolo cylindraceo, ad baſin vel craſſiori vel tenuiori; velo carens, ſed annulo ſpurio & fugaci donatus. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; cuius pileus conicus & quaſi plicatus; petiolus ad baſin tenuior, annuloque ſpurio & ſulcato ornatus.

Fig. II. Fungus ſe explicare incipiens; pileo & petiolo fungi antecedentis.

Fig. III. Fungus explicatus; pileum habens campaniformem, ad oram laceratum; petiolum ad baſin craſſiorem & annulo deſtitutum.

Fig. IV. Fungus nondum euolutus, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. V. VI. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der ſieben und ſechzigſten Kupfertafel.

Der ſechzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein dreyfärbiger, ſo wohl einfacher als vielfacher, hohler, unfleiſchiger, und mit der Zeit abänderlicher, Waſſerſchwam̃; mit einem anfangs kegeligen, nachher glockigen, und zuletzt auf mancherley Weiſe zerriſſenen, geſpaltenen, und nicht ſelten aufgerollten, Hute; mit einem runden, und unten bald dickern, bald dünnern, Stiele; ohne Saamendecke, aber mit einem unächten und unbeſtändigen Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.


Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwam̃; mit einem kegeligen, und gleichſam gefaltenen, Hute; mit einem unten dicklichern, und mit einem gefurchten Afterringe gezierten, Stiele.

Fig. II. Ein ſich entwickelnder Schwam̃; mit einem Hute und Stiele des vorigen Schwammes.

Fig. III. Ein entwickelter Schwam̃; mit glockigem und am Rande zerriſſenem Hute; mit einem unten dickern Stiele, und ohne Ring.

Fig. IV. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. LXVII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Noromb.

EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE OCTAVAE.

VARIETATES AGARICI SEXAGESIMI.

Quum agaricus antecedens, tam ratione explicationis, quam respectu coloris, multum variet; libet quasdam varietates indicare.

Fig. I. Fasciculus fungorum; variae explicationis.

Fig. II. Fungus euolutus minor; pileo ad oram quasi crenato.

Fig. III. Fungus euolui incipiens; pileo adhuc conico.

Fig. IV. Fungus parum explicatus, ad perpendiculum; dissectus cuiusque laminae nigrescunt.

Erklärung der acht und sechzigsten Kupfertafel.

Abänderungen des sechzigsten Blätterschwammes.

Da der vorhergehende Schwamm, so wohl der Entwickelung, als der Farbe nach, sich gar sehr abändert; so hat man nicht vor uneben angesehen, einige solcher Abänderungen vorstellig zu machen.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedener Entwickelung.

Fig. II. Ein entwickelter kleiner Schwamm; mit einem am Rande gleichsam gekerbten Hute.

Fig. III. Ein sich entwickelnder Schwamm; mit einem annoch kegeligen Hute.

Fig. IV. Ein etwas entwickelter und senkrecht zerschnittener Schwamm; dessen Saamenblätter anfangen schwarz zu werden.


Tab. LXVIII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEXAGESIMAE NONAE.

AGARICVS SEXAGESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus bicolor ſeu tricolor, & ſimplex & multiplex, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio globoſo, poſt conuexo, denique companiformi ac in centro ſaepe faſtigiato; petiolo vel ad medium vel ad baſin craſſiori; neque velum neque annulum habens. In *Bauaria* nomen deficit.

Fig. I. Faſciculus fungorum, variae explicationis.
Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo globoſo; petiolo ad medium craſſiori.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Fungus, & quoad pileum, & quoad petiolum, deformis.
Fig. V. Fungus paullulum euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. VI. Fungus euolutus; pileo campaniformi & in centro faſtigiato.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der neun und sechzigsten Kupfertafel.

Der ein und sechzigste Blätterschwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, oder dreyfärbiger, ſo wohl einfacher, als vielfacher, voller, fleiſchiger, und wenig veränderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachher gewölbten, zuletzt glockigen und in der Mitten oft zugeſpitzten, Hute; mit einem, bald in der Mitten, bald unten, dickern Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel Schwämme, von verſchiedener Entwickelung.
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit einem kugelrunden Hute, und einem in der Mitten dickern Stiele.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Ein, ſo wohl dem Hute, als Stiele nach, ungeſtalteter Schwamm.
Fig. V. Ein entwickelter Schwam̃, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem und in der Mitten zugeſpitztem Hute.
Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. LXIX
Fig. I
Fig. VII
Fig. III
Fig. II
Fig. VIII
Fig. VI
Fig. IV
Fig. V
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE.

AGARICVS SEXAGESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus tenerior, bicolor, plerumque ſolitarius, cauus, non carnoſus, parum varius; pileo plerumque conico, ſaepe tamen, vel hemiſphaerico, vel campanulato; petiolo cylindraceo, varie interdum tortuoſo, ad baſin craſſiori, ſaepe radicato; tam velo, quam annulo, orbatus. *Bauari* nomen ignorant.


Fig. I. Fungus euolutus; pileo formae digitalis.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo campanulato, in centro faſtigiato.
Fig. III. Fungus euolutus; pileo hemiſphaerico.
Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. Par fungorum; pileis diuerſis.
Fig. VII. IIX. Fungi explicati; pileis conicis; petiolis radicatis.
Fig. IX. X. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der zwey und ſechzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zarter, zweyfärbiger, insgemein einfacher, hohler, unfleiſchlicher, und wenig abänderlicher, Schwamm; mit einem meiſtentheils kegeligen, jedoch auch oftmals halbkugelrunden, oder glockigen, Hute; mit einem runden, und manchmal geſchlängelten, unten dickern, oft gewurzelten, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwmm, mit fingerhutähnlichem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem und in der Mitten zugeſpitztem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit halbkugelrundem Hute.
Fig. IV. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. Ein Paar Schwämme; mit unterſchiedenen Hüten.
Fig. VII. IIX. Entwickelte Schwämme; mit kegeligen Hüten und bewurzelten Stielen.
Fig. IX. X. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. LXX.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. X.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nuſsbiegel sc. Norimb.

AGARICVS SEXAGESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus bicolor, plerumque ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio globoſo, poſt conuexo; petiolo craſſo & tuberoſo; & velo, & annulo, orbatus. A *Bauaris* nullo nomine inſignitur.

Fig. I. Par fungorum; pileis ex parte deformibus; petiolis connatis; quorumque maior ligno inſidet.
Fig. II. Idem par fungorum; a parte poſteriori & quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus euolutus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der ein und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der drey und ſechzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, insgemein einfacher, fleiſchiger, wenig veränderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachher gewölbten, Hute; mit einem dicken und knolligen Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar Schwämme; mit ungeſtalteten Hüten und unten zuſammengewachſenen Stielen; und wo der gröſſere dem Holze aufſitzet.
Fig. II. Eben dieſes Paar Schwämme; nach der hintern Seite und Unterfläche.
Fig. III. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.



St. Loibel pinx. Ratisb.

H. I. Tyroff sc. Norimb.

VARIETATES AGARICI SEXAGESIMI TERTII.

Etſi fungos huius tabulae minime, vti praecedentis tabulae fungos, ad ligna offendi; nullus tamen dubito, eos non niſi agarici eiusdem eſſe varietates.

Fig. I. Par fungorum diuerſae magnitudinis, petiolis connatorum.

Fig. II. Fungus nondum penitus euolutus; pileo ad oram conuoluto.

Fig. III. Fungus euolutus; pileo conuexo; petiolo compreſſo.

Fig. IV. Fungus parum euolutus, ad perpendiculum diſſectus.

Erklärung der zwey und siebenzigsten Kupfertafel.

Abänderungen des drey und sechzigsten Blätterschwammes.

Ob ich gleich die Schwämme der gegenwärtigen Tafel niemalen so, wie die Schwämme der vorigen Tafel, auf Holze gefunden habe; so glaube ich doch, daß es nur bloße Abänderungen des gedachten Schwammes sind.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, von verschiedener Grösse; und welche mit ihren Stielen zusammengewachsen sind.

Fig. II. Ein noch nicht völlig entwickelter Schwamm; mit einem am Rande zusammengerollten Hute.

Fig. III. Ein sich entwickelnder Schwamm; mit gewölbtem Hute und zusammengedrücketem Stiele.

Fig. IV. Ein etwas entwickelter und senkrecht zerschnittener Schwamm.

Tab. LXXII.



St. Loibel pinx. Ratisb.

H. I. Tyroff sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE TERTIAE.

AGARICVS SEXAGESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus lacteus, vnicolor, & ſimplex & multiplex, farctus, parum carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt conuexo vel plano, denique infundibuliformi, ſaepe deformi; petiolo cylindraceo, ad baſin craſſiori; velo ac annulo carens. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. Faſciculus fungorum; quorum medius pileum conuexum, duo ad latera infundibuliformem & deformem gerunt.

Fig. II. Fungus paullulum euolutus; pileo globoſo.

Fig. III. Faſciculus fungorum minorum; pileis planis & radiatis.

Fig. IV. Fungus euolutus; pileo in formam infundibuli tranſire incipiente.

Fig. V. Fungus euolutus; pileo plano, radiato, & ad oram verſus circulis inſignito.

Fig. VI. Fungus infundibuliformis, quoad faciem inferiorem; vbi *a* guttulas lacteas, quas laeſus exſtillat, indicat.

Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der drey und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der vier und ſechzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, ſo wohl einfacher, als vielfacher, voller, wenig fleiſchiger, veränderlicher, Milchſchwamm; mit einem anfangs runden, nachher gewölbten oder flachen, endlich trichterförmigen, oft ungeſtalteten, Hute; mit einem runden, und unten dicklichen, Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel Schwämme; davon der Mittlere einen gewölbten, die zween an den Seiten einen trichterförmigen und ungeſtalteten Hut haben.

Fig. II. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.

Fig. III. Ein Büſchel kleiner Schwämme; mit flachen und geſtrahlten Hüten.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit einem trichterförmig werdenden Hute.

Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, geſtrahltem und gegen den Rand geringeltem Hute.

Fig. VI. Ein trichterförmiger Schwam̃, nach ſeiner Unterfläche; an welchem *a* die thränenartigen Milchtropfen andeutet, welcher dieſelben von ſich läſſet.

Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergrösſerte Saamenſtaub.



St. Loibel pinx. Ratisb. G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE QVARTAE.

AGARICVS SEXAGESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus bicolor, plerumque ſolitarius, farctus, paullulum carnoſus, parum varius; pileo ab initio conico vel globoſo, poſt conuexo, in centro ſaepe faſtigiato, ſemper piloſe ſquamoſo; petiolo cylindraceo, ad baſim paullulum craſſiori; velo & annulo membranaceo donatus. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo conico.

Fig. II. Fungus nondum euolutus; vbi velum membranaceum maxime adparet.

Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Par fungorum explicatorum; pileis conuexis; petiolis connatis.

Fig. V. Fungus maior euolutus; pileo in centro faſtigiato.

Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der vier und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der fünf und ſechzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, insgemein einzelner, voller, wenig fleiſchiger, und wenig abänderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, oder runden, nachher gewölbten, in der Mitten oft zugeſpitzten, allezeit aber haarigſchuppigen, Hute; mit einem runden, und unten etwas dicklichen, Stiele; mit einer häutigen Saamendecke, und einem dergleichen Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.

Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwam̃; wo die häutige Saamendecke ſonderlich ſichtbar iſt.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein Paar entwickelte Schwämme; mit gewölbten Hüten, und zuſammengewachſenen Stielen.

Fig. V. Ein gröſſerer entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten zugeſpitzten Hute.

Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. LXXIV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. VIII.
Fig. VII.
Fig. VI.
Fig. V.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE QVINTAE.

AGARICVS SEXAGESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, farctus, parum carnoſus, varius; pileo ab initio conico vel globoſo, poſt conuexo, in centro ſaepe faſtigiato, denique infundibuliformi, ſaepe deformi; petiolo rotundo, vel ad baſin vel ad medium craſſiori; nec velum, nec annulum, habens. Nomine apud *Bauaros* caret.


Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo conico; petiolo ad medium craſſiori.
Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo globoſo.
Fig. III. Fungus paullulum euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus euolutus; pileo in centro faſtigiato.
Fig. V. Fungus euolutus maior; pileo plano, ſubtiliſſime radiato, & quaſi quinquifido.
Fig. VI. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der fünf und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der ſechs und ſechzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, wenig fleiſchiger, veränderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachher gewölbten, in der Mitten oft zugeſpitzten, zuletzt trichterförmigen, oft ungeſtalteten, Hute; mit einem runden, und entweder unten, oder in der Mitten, dickern Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit einem kegeligen Hute, und einem in der Mitten dickern Stiele.
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit einem kugelrunden Hute.
Fig. III. Ein etwas entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten zugeſpitzten Hute.
Fig. V. Ein groſſer entwickelter Schwamm; mit flachem, zart geſtrahltem und gleichſam fünfſpaltigem Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit trichterförmigem Hute.
Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. LXXV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE SEXTAE.

AGARICVS SEXAGESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus, & ſolitarius & ceſpitoſus, non modo lignarius, ſed & quantus quantus lignoſus, omniumque maxime varius; pileus ſaepe floris figuram induit, plerumque deformem ſe exhibet; petiolo vel breuiſſimo, vel plane nullo; velo & annulo orbatus. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Par fungorum explicatorum; florem aemulantium, lignoque inſidentium.

Fig. II. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. III. Fungus explicari incipiens; oblongus; animal, capite, ventre & cauda donatum, quodammodo referens.

Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus, qui ex rima ligni modo erupit, adhuc tactu mollis.

Fig. VI. Fruſtulum fungi, variis circulis ſignati.

Fig. VII. Fungus ſingularis figurae, circulis eleuatus.

Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der ſechs und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der ſieben und ſechzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein, ſo wohl einzelner, als vielfacher, ganz ungemein abänderlicher, nicht nur ſeinem Weſen, ſondern auch, ſeinem Geburthsorthe nach, ſo genannter Holzſchwamm; mit einem vielmals blumenartigen, meiſtentheils ungeſtalteten Hute; mit einem entweder ſehr kleinen, oder gar keinen, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar entwickelte, blumenähnliche, und dem Holze aufſitzende, Schwämme.

Fig. II. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. III. Ein länglicher ſich entwickelter Schwamm, und der einem Thierähnlichen Kopf, Leib und Schwanz zu haben ſcheinet.

Fig. IV. Ein Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.

Fig. V. Ein zwiſchen der Holzſpalte kaum ausgebrochener, und noch weich anzufühlender, Schwamm.

Fig. VI. Ein Stückzen Schwamm, welches mit allerhand Ringen gezieret iſt.

Fig. VII. Ein ſonderbar gebildeter Schwamm, mit erhabenen Ringen.

Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. LXXVI.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. IIX.
Fig. IX.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS SEXAGESIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus eſculentus, vnicolor, & ſimplex & multiplex, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio conico, poſtea campanulato, ad oram plicato, in centro ſaepe faſtigiato; petiolo cylindraceo, ad baſin tenuiori; velo & annulo deſtitutus. In *Bauaria*, ob odorem aromaticum, *Nägelſchwämmgen* appellatur.

Fig. I. Faſciculus fungorum, diuerſae aetatis & explicationis.
Fig. II. Fungus explicatus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus explicatus; pileo in centro faſtigiato.
Fig. V. Par fungorum, & pileis & petiolis connatorum.
Fig. VI. Fungus explicatus; pileo campanulato.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der sieben und siebenzigsten Kupfertafel.

Der acht und sechzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein eßbarer, einfärbiger, so wohl einfacher als vielfacher, voller, fleischiger, veränderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachher glockigen, am Rande gefaltenen, und in der Mitten oft zugespitzten, Hute; mit einem runden, unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. In **Bayern** wird er, wegen seines gewürzhaften Geruchs, **Nägelschwämmgen** genennet.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedenem Alter und verschiedener Entwickelung.
Fig. II. Ein entwickelter und senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten zugespitzten Hute.
Fig. V. Ein Paar Schwämme, mit zusammengewachsenen Hüten und Stielen.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwam̃; mit glockigem Hute.
Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LXXVII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS SEXAGESIMVS NONVS.

Eſt fungus fere vnicolor, plerumque ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio vel rotundo vel conico, poſt hemiſphaerico; petiolo tuberoſo, ſaepe adpendiculato; velo & annulo deſtitutus. *Bauaris* eſt anonymus.


Fig. I. Fungus maior; petiolo ex parte deformi.
Fig. II. Fungus paullulum euolutus; pileo conuexo; petiolo adpendiculato.
Fig. III. Fungus euolutus; quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus parum euolutus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Faſciculus fungorum, variae explicationis; omnium inter ſe connatorum.
Fig. VI. Par fungorum, explicari incipientium.
Fig. VII. Fungus explicatus; pileo deformi.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der acht und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der neun und ſechzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein faſt einfärbiger, meiſtentheils einzelner, voller, fleiſchiger, und wenig veränderlicher, Schwam̃; mit einem anfänglich entweder runden oder kegeligen, nachher halbrunden, Hute; mit einem knolligen, oft geſchwänzten Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein kleiner Schwamm; mit einem etwas ungeſtalteten Hute.
Fig. II. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute; und geſchwänztem Stiele.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein etwas entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Ein Büſchel Schwämme, von verſchiedener Entwickelung; und welche alle unten zuſammengewachſen ſind.
Fig. VI. Ein Paar ſich entwickelnde Schwämme.
Fig. VII. Ein entwickelter Schwamm; mit ungeſtaltetem Hute.
Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. LXXVIII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. VI.
Fig. VII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE SEPTVAGESIMAE NONAE.

AGARICVS SEPTVAGESIMVS.

Eſt fungus, ob locum natalem, lignarius, vnicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio rotundiuſculo, poſt hemiſphaerico, denique planiuſculo; petiolo paullulum ſtriato, ad baſin modo craſſiori, modo tenuiori; velo nullo, ſed annulo ſpurio praeditus. Apud *Bauaros* nomen habet nullum.

Fig. I. Trias fungorum explicatorum, ligno inſidentium.

Fig. II. Par fungorum, nondum euolutorum; ligno, ſub terra latenti, inſidentium.

Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. V. Fungus explicatus; pileo reniformi; petiolo ad baſin tenuiori.

Fig. VI. Fungus euolutus; pileo planiuſculo; petiolo ad baſin craſſiori.

Fig. VII. Fungus explicatus; pileo conuexo; petiolo ad baſin tenuiori.

Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der neun und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der ſiebenzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, wenig veränderlicher, und, vermöge ſeines Geburthsortes, ſogenannter Holzſchwamm; mit einem anfangs rundlichen, nachher halbrunden, und endlich etwas flachen, Hute; mit einem etwas geſtrichelten, und unten, bald dickern, bald dünnern, Stiele; ohne Saamendecke, aber mit einem Afterringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Drey entwickelte und dem Holze aufſitzende Schwämme.

Fig. II. Ein Paar noch nicht entwickelte, und dem, unter der Erde verborgen liegenden, Holze aufſitzende, Schwämme.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.

Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.


Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit nierenförmigem Hute, und einem unten dünnern Stiele.

Fig. VI. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit einem etwas flachen Hute, und einem unten dickern Stiele.

Fig. VII. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute, und einem unten dünnern Stiele.

Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Tab. LXXIX.



St. Loibel pinx. Ratisb. Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE.

AGARICVS SEPTVAGESIMVS PRIMVS.

Est fungus fere vnicolor, plerumque multiplex, farctus, paullulum carnosus, parum varius; pileo ab initio conico, post campanulato, denique planiusculo ac in centro fastigiato, semper pilose squamoso; petiolo striato, ad basin crassiori, pariter pilose squamoso; velo nullo, sed annulo spurio donatus. Apud *Bauaros* nomine caret.

Fig. I. Fasciculus fungorum, variae aetatis & explicationis.
Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus explicari incipiens, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus paullulum euolutus, ad perpendiculum dissectus.
Fig. V. Fungus explicatus; pileo planiusculo, in centro fastigiato.
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der achtzigsten Kupfertafel.

Der ein und siebenzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein fast einfärbiger, meistentheils vielfacher, voller, etwas fleischiger, und wenig veränderlicher, Schwam̃; mit einem anfangs kegeligen, nachher glockigen, endlich etwas flachen und in der Mitten zugespitzten, allezeit haarigschuppigen, Hute; mit einem gestrichelten, unten dicklichern, und gleichfalls haarigschuppigen, Stiele; ohne Saamendecke, aber mit einem Afterringe. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedenem Alter und verschiedener Entwickelung.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; nach seiner Unterfläche.
Fig. III. Ein sich entwickelnder Schwamm, nach seiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein etwas entwickelter und senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit etwas flachem, und in der Mitten zugespitztem, Hute.
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LXXX.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS SEPTVAGESIMVS SECVNDVS.

Est fungus tricolor, & solitarius & fasciculosus, farctus, parum carnosus, varius; pileo ab initio rotundo, post conuexo, denique plano; petiolo cylindraceo, ab basin crassiori, saepe tuberoso: velo araneoso, sed annulo nullo. Nomen in *Bauaria* datur nullum.


Fig. I. Par fungorum explicatorum; pileis fere planis; petiolis connatis.
Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus euolutus; pileo plano, ad oram inaequali.
Fig. IV. Par fungorum nondum euolutorum; pileis rotundis.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum dissectus.
Fig. VI. Fungus explicatus; pileo conuexo.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. IIX. Pollen vitro auctus.

Erklärung der ein und achtzigsten Kupfertafel.

Der zwey und siebenzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein dreyfärbiger, so wohl einzelner, als büscheliger, voller, wenig fleischiger, veränderlicher, Schwamm; mit einem anfangs runden, nachher gewölbten, endlich flachen, Hute; mit einem runden, unten dickern, oft knolligen, Stiele; mit einer spinnenwebigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar entwickelte Schwämme; mit flachen Hüten, und zusammengewachsenen Stielen.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem und am Rande ungleichem Hute.
Fig. IV. Ein Paar noch unentwickelte Schwämme; mit runden Hüten.
Fig. V. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwam̃; mit gewölbtem Hute.
Fig. VII. Der natürliche Saamenstaub.
Fig. IIX. Der vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LXXXI.
Fig. I.
Fig. VII.
Fig. IIX.
Fig. II.
Fig. IV.
Fig. III.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Rat.
G. P. Tyroff sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS SEPTVAGESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus eſculentus, vnicolor, & ſolitarius & faſciculoſus, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio rotundiuſculo, poſt conuexo, ſaepe infundibuliformi & ad oram varie inciſo & reuoluto; petiolo rotundo, ad baſin vel tenuiori vel craſſiori; velo & annulo carens. A *Bauaris* nominatur *Pfiff.rling*, vel *Rehgeiſs*.

Fig. I. Faſciculus fungorum, nondum euolutorum; pileis rotundiuſculis; petiolis tuberoſis.

Fig. II. Fungus euolutus; pileo plano, floriformi, & quaſi multifido.

Fig. III. Fungus euolutus minor; pileo pariter plano, florem aemulanti & multifido.

Fig. IV. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem; pileo infundibuliformi.

Fig. V. Fungus explicatus; pileo conuexo; petiolo ad baſin craſſiori.

Fig. VI. Par fungorum explicatorum, pileis & petiolis connatorum.

Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.


Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zwey und achtzigſten Kupfertafel.

Der drey und ſiebenzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein eßbarer, einfärbiger, ſo wohl einzelner, als vielfacher, voller, fleiſchiger, veränderlicher, Schwamm; mit einem anfänglich rundlichen, nachher gewölbten, oft trichterförmigen, und am Rande auf mancherley Weiſe eingeſchnittenen und aufgerollten, Hute; mit einem runden, und unten entweder dickern, oder dünnern, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. In **Bayern** heiſſet er **Pfifferling**, oder **Rehgeiß**.

Fig. I. Ein Büſchel noch unentwickelte Schwämme; mit rundlichen Hüten und knolligen Stielen. Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, blumenähnlichem, und gleichſam vielſpaltigem, Hute. Fig. III. Ein kleiner entwickelter Schwamm; mit ebenfalls flachem, blumenähnlichem und vielſpaltigem Hute. Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche; mit trichterförmigem Hute. Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute, und einem unten dickern Stiele. Fig. VI. Ein Paar entwickelte Schwämme, welche mit ihren Hüten und Stielen zuſammengewachſen ſind. Fig. VII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm. Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. LXXXII.
Fig. I.
Fig. IIX.
Fig. IX.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Schaeer pinx. Rat.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

AGARICVS SEPTVAGESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus lacteſcens, eſculentus, bicolor & fere vnicolor, plerumque ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio rotundo, poſt conuexo, denique plano, ſaepe infundibuliformi; petiolo cylindraceo, modo breuiori, modo longiori, ad baſin tenuiori; velo & annulo deſtitutus. *Bauaris* dicitur *Haendiger Taeubling*.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibulum referente; petiolo breuiori.

Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem; vbi *a* guttulas lacteas, quibus totus turget, deſignat.

Fig. III. Fungus explicatus; pileo conuexo, in centro depreſſo.

Fig. IV. Fungus explicari incipiens; quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Par fungorum, variae explicationis; quorum maior pileum planum, minor conuexum, gerit.

Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der drey und achtzigſten Kupfertafel.

Der vier und ſiebenzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein eßbarer, zweyfärbier, und beynahe einfärbiger, insgemein einzelner, voller, fleiſchiger, veränderlicher, Milchſchwamm; mit einem anfangs runden, nachher gewölbten, endlich flachen, oft trichterförmigen, Hute; mit einem runden, bald kürzern, bald längern, und unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. In Bayern heißt er **Händiger Täubling.**

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit trichterförmigem Hute, und mit einem kurzen Stiele.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche; wo *a* die Milchtropfen, mit welchen er angefüllet iſt, anzeiget.


Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem und in der Mitten vertieftem Hute.

Fig. IV. Ein ſich entwickelnder Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.

Fig. V. Ein Paar Schwämme, von verſchiedener Entwickelung; davon der gröſſere einen flachen, der kleinere einen gewölbten, Hut hat.

Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. LXXXIII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. IIX.
a
Soph. Beezin pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE QVARTAE.

AGARICVS SEPTVAGESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus ex maioribus, tricolor, ſolitarius, fiſtuloſus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio vel conico, vel piriformi, poſt campanulato, ſemper piloſe ſquamoſo; petiolo cylindraceo, craſſo, ſaepe pariter piloſe ſquamoſo; velo ſpurio, ſed annulo nullo, donatus. In *Bauaria* nomine caret.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo piriformi; velo ſpurio ornatus.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo campanulato, ad oram inciſo.

Fig. III. Fungus explicatus ad perpendiculum diſſectus.

Erklärung der vier und achtzigſten Kupfertafel.


Der fünf und ſiebenzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein groſſer, dreyfärbiger, einzelner, hohler, fleiſchiger, wenig veränderlicher, Schwamm; mit einem anfangs entweder kegeligen, oder birnförmigen, nachher glockigen, allezeit haarigſchuppigen, Hute; mit einem runden, dickern, und bisweilen ebenfalls haarigſchuppigen, Stiele; mit einer unächten Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit einem birnförmigen Hute, und mit der unächten Saamendecke.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem, und am Rande eingeſchnittenem, Hute.

Fig. III. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.



Soph. Beezin pinx. Rat. G. P. Tyroff sc. Norimb.

AGARICVS SEPTVAGESIMVS SEXTVS.

Est fungus volua exceptus, bicolor, fere semper solitarius, fistulosus, paullulum carnosus, varius; pileo ab initio rotundo, post hemisphaerico, denique vel campanulato vel conuexo vel plano; petiolo cylindraceo, in origine bulboso, sursum adtenuato, plerumque incuruo; velo & annulo destitutus, sed volua coriacea ac persistenti donatus. *Bauaris* est anonymus.


Fig. I. Fungus iunior & minor, totus intra voluam latens. Fig. II. Par fungorum explicatorum, voluis connatorum. Fig. III. Fungus ex volua rupta adscendens. Fig. IV. Fungus explicari incipiens, pileo conuexo; petiolo a voluae fragmentis quasi annulato. Fig. V. Fungus nondum explicatus, minor; pileo rotundiusculo; petiolo incuruo. Fig. VI. Fungus ad perpendiculum dissectus. Fig. VII. Fungus explicatus; pileo plano, in centro fastigiato; petiolo recto. Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der fünf und achtzigsten Kupfertafel.

Der sechs und siebenzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, fast allezeit einzelner, hohler, etwas fleischiger, veränderlicher Eyschwamm; mit einem anfänglich runden, nachher halbrunden, und endlich glockenförmigen, oder gewölbten, oder flachen, Hute; mit einem runden, unten knolligen, nach oben zu dünn auslaufenden, meistens gekrümten, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring, aber mit einem lederhaften und beständigen Eye. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein junger und kleiner Schwamm, wie er noch ganz und gar in seinem Eye verborgen lieget. Fig. II. Ein Paar entwickelte und mit ihren Eyern zusammen gewachsene Schwämme. Fig. III. Ein aus seinem zerrissenen Eye emporsteigender Schwamm. Fig. IV. Ein sich entwickelnder Schwamm, mit gewölbtem Hute; und mit einem von den zurück gebliebenen Stücken des Eyes gleichsam geringelten Stiele. Fig. V. Ein noch unentwickelter kleiner Schwamm; mit rundlichem Hute, und gekrümmtem Stiele. Fig. VI. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm. Fig. VII. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, und in der Mitten zugespitztem, Hute, und mit einem geraden Stiele. Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LXXXV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. IIX.
Fig. IX.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE SEXTAE.

VERIETATES AGARICI SEPTVAGESIMI SEXTI.

Agaricus praecedens ſeptuageſimus ſextus magnitudine ita differt, vt vix eiusdem eſſe ſpeciei iudices, vti ex iconibus huius & prioris tabulae videre licet.

Fig. I. Volua magna, adhuc integra, quae iuniorem fungum totum inuoluit.

Fig. II. Fungus ex volua lacerata adſcendens & ſe explicans.

Fig. III. Volua, vna cum fungo inuoluto, ad perpendiculum diſſecta.

Fig. IV. Fungus explicatus maior, quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Fungus euolutus maior; pileo campanulato, in centro faſtigiato.

Erklärung der sechs und achtzigsten Kupfertafel.

Abänderungen des sechs und siebenzigsten Blätterschwammes.

Es ist der vorhergehende sechs und siebenzigste Blätterschwamm unter andern, der Grösse nach, dergestalt verschieden, daß man ihn kaum vor einerley und eben dieselbe Gattung halten sollte; und können die gegenwärtigen und vorigen Abbildungen davon zu einem Beweise dienen.


Fig. I. Ein grosses, noch unverletztes, Ey, von welchem der junge Schwamm ganz und gar umhüllet ist.

Fig. II. Ein aus dem zerborstenen Eye emporsteigender und sich entwickelnder Schwamm.

Fig. III. Ein senkrecht zerschnittenes Ey, mit dem darinn liegenden Schwamme.

Fig. IV. Ein grosser entwickelter Schwamm, nach seiner Unterfläche.

Fig. V. Ein grosser entwickelter Schwamm; mit glockigem, und in der Mitten zugespitztem, Hute.


Tab. LXXXVI
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS SEPTVAGESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus bicolor, & ſimplex & multiplex, farctus, carnoſus, valde varius; pileo per omnem aetatem fere ſemper alio, rotundo, conuexo, deformi, integro, inciſo ac lacerato; petiolo pariter incerto, craſſiori, tenuiori, ſupra- infra- ad medium ventricoſo, rotundo, compreſſo, integro, lacerato, ſtriato, ſulcato, radicato, deformi; velo & annulo nullo. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Fungus explicatus, pileo conuexo, dirupto; petiolo inuerſe conico, ligni fruſtulo inſidente. Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem. Fig. III. Idem fungus ad perpendiculum diſſectus. Fig. IV. Faſciculus fungorum, ex vna radice ramos aemulantium, variae figurae & explicationis. Fig. V. Fungus nondum explicatus; pileo plicato; petiolo quaſi radicato. Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der ſieben und achtzigſten Kupfertafel.

Der ſieben und ſiebenzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſo wohl einfacher, als vielfacher, voller, fleiſchiger, und ſehr veränderlicher, Schwamm; mit einem zu allen Zeiten des Alters faſt ſtets andern, runden, gewölbten, unförmlichen, ganzen, eingeſchnittenen und zerriſſenen, Hute; mit einem gleichfalls ungewiſſen, dickern, dünnern, oben- unten- oder in der Mitten bauchigen, runden, zuſammen gedrückten, ganzen, zerriſſenen, geſtrichelten, gefurchten, wurzelhaften, oder unförmlichen, Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem und zerborſtenem Hute; mit einem umgekehrt kegeligen, und einem Stückgen Holze aufſitzenden, Stiele. Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche. Fig. III. Eben derſelbe Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten. Fig. IV. Ein Büſchel Schwämme, von verſchiedener Geſtalt und Entwickelung; und die aus einer einzigen Wurzel, wie Zweige oder Aeſte, von einander abſtehen. Fig. V. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit gefaltenem Hute; und einem wurzelähnlichen Stiele. Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. LXXXVII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Soph. Beezin pinx. Ratisb.
G. P. Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE OCTAVAE.

VARIETATES AGARICI SEPTVAGESIMI SEPTIMI.

Etsi varietates agarici praecedentis vere innumerae offenduntur; placet tamen duas singularis figurae exhibere.

Fig. I. Fungus explicatus; petiolo fere plano, floriformi, ad oram inciso, in superficie lineis signato, lamellis in centro conspicuis; petiolo longo, incuruo, dimidia parte superiori profunde sulcato, inferiori integro, subtiliter striato.

Fig. II. Fungus deformis; pileo plano, lamellis ad oram reuolutis; petiolo peculiaris plane structurae & figurae.

Erklärung der acht und achtzigsten Kupfertafel.


Abänderungen des sieben und siebenzigsten Blätterschwammes.

Obgleich die Abänderungen des vorhergehenden Schwammes unzählbar sind; so habe ich es doch vor gut angesehen, ein Paar dergleichen von sonderbarer Bildung vorstellig zu machen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit fast flachem, blumenähnlichem, am Rande eingeschnittenem, oben mit allerhand Strichen gezeichnetem Hute, und in dessen Mittelpuncte die Saamenblätter sichtbar sind; mit einem langen, krummen, und an der obern Hälfte tief gefurchten, an der untern Hälfte ganzen, und zart gestrichelten, Stiele.

Fig. II. Ein ungestalteter Schwamm; mit flachem Hute, und an dessen Rande die Saamenblätter aufgerollet sind; mit einem Stiele von ganz besonderm Baue und seltener Gestalt.

Tab. LXXXVIII.



Soph. Beezin pinx. Ratisb.

G. P. Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE OCTOGESIMAE NONAE.

AGARICVS SEPTVAGESIMVS OCTAVVS.

Est fungus bicolor, & solitarius & fasciculosus, farctus, paullulum carnosus, parum varius; pileo fere semper conico, striis & maculis signato; petiolo tuberoso; velo & annulo carens. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fasciculus fungorum, variae explicationis; quorum duo maiores pileis connati sunt.

Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo conico.

Fig. III. Fungus paullulum explicatus; pileo ex conico hemisphaerico.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der neun und achtzigsten Kupfertafel.

Der acht und siebenzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, so wohl einzelner, als büschelicher, voller, etwas fleischiger, und wenig veränderlicher, Schwamm; mit einem fast allezeit kegeligen, gestrichelten und gefleckten, Hute; mit knolligem Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büschel Schwämme, von verschiedener Entwickelung; davon die zween grösseren mit ihren Stielen zusammen gewachsen sind.


Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.

Fig. III. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit einem kegeligrunden Hute.

Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.

Fig. V. Der natürliche Saamenstaub.

Fig. VI. Der vergrösserte Saamenstaub.


Tab. LXXXIX.
Fig. I.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
St. Loibel pinx. Ratisb.
H. I. Tyroff sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE.

AGARICVS SEPTVAGESIMVS NONVS.

Eſt fungus volua ſpuria donatus, bicolor, ſolitarius, farctus, vix carnoſus, varius; pileo ab initio rotundo, poſt hemiſphaerico, deinde conuexo, denique plano vel infundibuliformi; petiolo rotundo & tuberoſo; velo coriaceo ac annulo perſiſtenti praeditus. In *Bauaria* nominatur *wilder Fliegenſchwamm.*

Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano, voluae fragmentis maculato; petiolo ad baſin lacerato.

Fig. II. Fungus euolutus; pileo plano, a centro ad oram radiato, maculato; petiolo ad baſin ſpurie annulato.

Fig. III. Fungus explicari incipiens; pileo piloſe ſtriato & maculato; petiolo ſpurie in medio & ad baſin annulato.

Fig. IV. Fungus nondum explicatus; pileo rotundo.

Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. VI. Fungus explicatus, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der neunzigſten Kupfertafel.

Der neun und ſiebenzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, faſt gar nicht fleiſchiger, abänderlicher, unächter Eyſchwamm; mit einem anfänglich runden, nachher halbrunden, alsdenn gewölbten, und endlich trichterförmigen, Hute; mit einer lederhaften Saamendecke und einem beſtändigen Ringe. In **Bayern** heiſſet er **wilder Fliegenſchwamm.**

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, und von den Eyſtücken geflecktem, Hute; mit einem unten zerriſſenen Stiele.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, von dem Mittelpuncte dem Rande zu, geſtrahltem und geflecktem Hute; mit einem unten unächt geringelten Stiele.


Fig. III. Ein ſich entwickelnder Schwam̃; mit einem haarig geſtrichelten und gefleckten Hute; mit einem in der Mitten und unten unächt geringelten Stiele.

Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit rundem Hute.

Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.

Fig. VI. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XC.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
H. I. Tyroff sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS OCTOGESIMVS.

Eſt fungus volua ſpuria exceptus, bicolor, fere tricolor, plerumque ſolitarius, farctus, parum carnoſus, varius; pileo ab initio hemiſphaerico, poſt conuexo, denique plano, ſaepe infundibuliformi; petiolo tuberoſo, rotundo, ſpurie ſaepe annulato; velo coriaceo & annulo perſiſtenti ornatus. In *Bauaria* dicitur *wilder Fliegenſchwamm.*

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo volua ſpuria inuoluto.

Fig. II. Par fungorum; quorum maioris pileus fragmentis voluae ſpuriae laceratae maculatus, minor nondum euolutus, eſt.

Fig. III. Fungus nondum euolutus, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IV. Fungus nondum euolutus; pileo hemiſphaerico, velo adhuc integro; petiolo ſpurie annulato.

Fig. V. Fungus euolutus; pileo conuexo, fragmentis voluae maculato & quaſi granulato; pileo ad baſin ſpurie annulato.

Fig. VI. Fungus euolutus, ad perpendiculum diſſectus.

Pollen idem eſt, ac praecedentis agarici.

Erklärung der ein und neunzigſten Kupfertafel.

Der achtzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, und faſt dreyfärbiger, insgemein einzelner, voller, wenig fleiſchiger, veränderlicher, unächter Eyſchwamm; mit einem anfänglich halbrunden, nachher gewölbten, endlich flachen, oft trichterförmigen, Hute; mit einem knolligen, runden, oft unächt geringelten, Stiele; mit einer lederhaften Saamendecke, und einem beſtändigen Ringe. In **Bayern** wird er **wilder Fliegenſchwamm** genennet.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwam̃; mit einem von dem Aftereye bedeckten Hute.

Fig. II. Ein Paar Schwämme; davon der Hut des gröſſeren von den Stücken des zerriſſenen Aftereyes gefleckt, der kleinere aber noch unentwickelt, iſt.


Fig. III. Ein noch unentwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwam̃; mit halbrundem Hute, und noch ganzer Saamendecke; mit einem unächten geringelten Stiele.

Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem, von den Eyſtücken geflecktem, und gleichſam knopperigem, Stiele.

Fig. VI. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Der Saamenſtaub iſt eben ſo, wie bey dem vorhergehenden Schwamme.



Tab. XCI
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
H. I. Tyroff sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS OCTOGESIMVS PRIMVS.

Est fungus esculentus, bicolor, plerumque solitarius, farctus, carnosus, varius; pileo ab initio rotundo, post conuexo, deinde plano, saepe infundibuliformi; petiolo rotundo, recto vel incuruo, ad basin plerumque crassiori; velo & annulo orbatus. In *Bauaria* nominatur *rother Taeubling*.


Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano, ad oram striato.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi & compresso.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo conuexo, in centro depresso.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum dissectus.
Fig. V. Fungus nondum euolutus; pileo rotundo.
Fig. VI. Fungus explicatus; pileo plano, subtilissime striato.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zwey und neunzigsten Kupfertafel.

Der ein und achtzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein eßbarer, zweyfärbiger, insgemein einzelner, voller, fleischiger, abänderlicher, Schwam̃; mit einem anfänglich runden, nachher gewölbten, endlich flachen, oft trichterförmigen, Hute; mit einem runden, geraden oder krummen, unten insgemein dickern, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. In Bayern heißt er **rother Täubling**.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem und am Rande gestricheltem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwam̃; mit trichterigem und zusammengedrucktem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem und in der Mitten vertieftem Hute.
Fig. IV. Ein senkrecht zerschnittener Schwamm.
Fig. V. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit rundem Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem und sehr zart gestricheltem Hute.
Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.


Tab. XCII.
Fig. I.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE TERTIAE.

AGARICVS OCTOGESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus eſculentus, bicolor, fere ſemper ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio rotundo, poſt conuexo & ſaepius in centro depreſſo, non raro infundibuliformi; petiolo cylindraceo, ad baſin ſaepe modo tenuiori, modo craſſiori; velo & annulo deſtitutus. In *Bauaria* dicitur *blauer Taeubling*.


Fig. I. Fungus explicatus; pileo conuexo, per centrum ſulcato.
Fig. II. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo conuexo, in centro excauato; petiolo ad baſin tenuiori.
Fig. IV. Fungus explicatus; pileo conuexo, ſubtiliſſime ſtriato.
Fig. V. Fungus maior, explicatus; pileo planiuſculo, in centro depreſſo, ad oram quaſi plicato.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der drey und neunzigſten Kupfertafel.

Der zwey und achtzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein eßbarer, zweyfärbiger, faſt allezeit einzelner, voller, fleiſchiger, abänderlicher, Schwamm; mit einem anfänglich runden, nachher gewölbten und in der Mitten oft vertieften, auch bisweilen trichterförmigen, Hute; mit einem runden, unten oft dickern, oft dünnern, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. In **Bayern** heißt er **blauer Täubling**.

Fig. I. Ein unentwickelter Schwam̃; mit gewölbtem, in der Mitten gefurchtem, Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein entwickelter Schwam̃; mit gewölbtem, in der Mitten vertieftem, Hute; mit einem unten dünnern Stiele.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwam̃; mit gewölbtem, und ſehr zart geſtricheltem, Hute.
Fig. V. Ein groſſer entwickelter Schwamm; mit etwas flachem, in der Mitten vertieftem, am Rande gleichſam gefaltenem, Hute.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XCIII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
St. Loibel pinx. Rat.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE QVARTAE.

AGARICVS OCTOGESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus eſculentus, bicolor, per aetatem tricolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio rotundo, poſt conuexo vel plano, in centro ſaepe excauato, non raro infundibuliformi; petiolo cylindraceo, ad baſin plerumque craſſiori; nec velum, nec annulum, habens. Apud *Bauaros* nomine *grauer Taeubling*, ſeu *Graeuling*, inſignitur.


Fig. I. Fungus maior, explicatus; pileo fere plano, in centro excauato.
Fig. II. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo conuexo.
Fig. IV. Fungus explicatus; pileo conuexo, in centro ſulcato & quaſi in duas partes aequales diuiſo.
Fig. V. Fungus paullulum euolutus; pileo rotundiuſculo.
Fig. VI. Fungus euolutus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der vier und neunzigſten Kupfertafel.

Der drey und achtzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein eßbarer, zweyfärbiger, mit dem Alter dreyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, abänderlicher, Schwam̃; mit einem anfänglich runden, nachher gewölbten, oder flachen, in der Mitten oft vertieften, und bisweilen trichterförmigen, Hute; mit einem runden, unten insgemein dickern, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. In **Bayern** wird er **grauer Täubling** oder **Gräuling** genennet.

Fig. I. Ein groſſer entwickelter Schwamm; mit faſt flachem, in der Mitten vertieftem, Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem, in der Mitten gefurchtem und gleichſam in zween gleiche Theile abgetheiltem, Hute.
Fig. V. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit rundlichem Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XCIV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
St. Loibl pinx. Ratisb.
G. P. Nußbiegel sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE QVINTAE.

AGARICVS OCTOGESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus volua exceptus, bicolor, ſolitarius, farctus, paullulum carnoſus, varius; pileo ab initio conico, poſt campanulato ſeu conuexo, denique plano, ſaepe maculato & ad oram ſtriato; petiolo cylindraceo, ſtriato, ad baſin craſſiori; velo & annulo deſtitutus, ſed volua coriacea & perſiſtenti donatus. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus intra voluam adhuc latens.

Fig. II. Fungus euolutus; pileo plano, ad oram ſtriato.

Fig. III. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Fungus maior explicatus; pileo conuexo, fragmentis voluae maculato, ad oram ſtriato.

Fig. V. Fungus euolutus; ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VI. Fungus explicatus; pileo campanulato.

Fig. VII. Par fungorum, voluis connatorum, ex eisque diruptis adſcendentium.


Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der fünf und neunzigſten Kupfertafel.

Der vier und achtzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfacher, einzelner, voller, etwas fleiſchiger, abänderlicher, Eyſchwam̃; mit einem anfangs kegeligen, nachher glockigen und gewölbten, endlich flachen, oft gefleckten, und am Rande geſtrichelten, Hute; mit einem runden, geſtrichelten, und unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring, aber mit einem lederhaften und beſtändigen Eye. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm, wie er noch in ſeinem Eye verborgen lieget. Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem und am Rande geſtricheltem Hute. Fig. III. Ein entwickelter Schwam̃, nach ſeiner Unterfläche. Fig. IV. Ein gröſſerer entwickelter Schwam̃; mit gewölbtem, von den Ueberbleibſeln des Eyes geflecktem, und am Rande geſtricheltem, Hute. Fig. V. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm. Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute. Fig. VII. Ein Paar Schwämme, welche mit ihren Eyern zuſammengewachſen ſind, und wie ſie aus denſelben emporſteigen. Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XCV.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. IIX.
Fig. IX.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

AGARICVS OCTOGESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus tricolor, fere ſemper ſolitarius, farctus & interdum paullulum cauus, carnoſus, varius; pileo ab initio rotundo ſeu conico, poſt campanulato ſeu conuexo, ſaepe deformi; petiolo ad baſin ſaepe craſſiori, & curuato; velo membranaceo & annulo perſiſtenti. In *Bauaria* dicitur *wilder Champignon*, ſeu *wildes Ehegärtel*.


Fig. I. Fungus maior explicatus; pileo campanulato, ſubtiliſſime ſtriato.
Fig. II. Fungus nondum euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus explicatus; pileo conuexo, ſtriato.
Fig. V. Fungus explicatus; pileo angulato, a centro ad oram radiato.
Fig. VI. Fungus explicatus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. Fungus nondum explicatus; pileo ex rotundo conico.
Fig. IIX. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der ſechs und neunzigſten Kupfertafel.

Der fünf und achtzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein dreyfärbiger, faſt allezeit einzelner, voller und bisweilen etwas hohler, fleiſchiger, abänderlicher, Schwamm; mit einem anfänglich runden oder kegeligen, nachher glockigen oder gewölbten, oft ungeſtalteten, Hute; einem unten oft dickern und gekrümmten Stiele; mit einer häutigen Saamendecke, und einem beſtändigen Ringe. In Bayern heißt er **wilder Champignon**, oder **wildes Ehegärtel.**

Fig. I. Ein größerer entwickelter Schwamm; mit glockigem und ſehr zart geſtricheltem Hute.
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem und geſtricheltem Hute.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit eckigem und in der Mitte, dem Rande zu, geſtrahltem Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit kegelrundem Hute.
Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.


Tab. XCVI.
Fig. I.
Fig. IIX.
Fig. IX.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. V.
Fig. IV.
Fig. VI.
Fig. VII.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS OCTOGESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus bicolor vel tricolor, plerumque ſimplex, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio conico, ſaepe rotundiuſculo, poſt hemiſphaerico vel infundibuliformi; petiolo cylindraceo, ad baſin vel tenuiori vel craſſiori, ſaepe curuato; velo araneoſo, ſed annulo nullo. *Bauari* nomen neſciunt.


Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo conico, petiolo ad baſin obtuſe acuto. Fig. II. Fungus nondum euolutus; vbi velum araneoſum maxime conſpicuum eſt. Fig. III. Fungus euolutus; pileo infundibuliformi; petiolo curuato, ad baſin craſſiori. Fig. IV. Fungus paullulum euolutus; cuius petiolo duo minores ſingulari modo adnati. Fig. V. Par fungorum nondum euolutorum; pileis hemiſphaericis; petiolis ad baſin connatis. Fig. VI. Fungus nondum euolutus; petiolo curuato. Fig. VII. Fungus nondum euolutus; pileo rotundiuſculo. Fig. IIX. Faſciculus fungorum minorum, ad baſin connatorum. Fig. IX. Fungus euolutus, ad perpendiculum diſſectus. Fig. X. XI. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der ſieben und neunzigſten Kupfertafel.

Der ſechs und achtzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, oder dreyfärbiger, insgemein einfacher, voller, fleiſchiger, abänderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, oft rundlichen, nachher halbrunden oder trichterförmigen, Hute; mit einem runden, unten dickern oder dünnern, oft gekrümmten, Stiele; mit einer ſpinnenwebigen Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwam̃; mit kegeligem Hute; und einem unten ſtumpfzugeſpitzten Stiele. Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; an dem die ſpinnenwebige Saamendecke ſonderlich zu ſehen iſt. Fig. III. Ein unentwickelter Schwam̃; mit trichterförmigem Hute; mit einem gekrümmten und unten dickern Stiele. Fig. IV. Ein etwas entwickelter Schwam̃; deſſen Hute zween kleinere auf eine beſondere Art angewachſen ſind. Fig. V. Ein Paar noch unentwickelte Schwämme; mit halbrunden Hüten, und deren Stiele unten zuſammengewachſen ſind. Fig. VI. Ein noch unentwickelter Schwam̃; mit gekrūm̃tem Stiele. Fig. VII. Ein noch unentwickelter Schwam̃; mit rundlichem Hute. Fig. IIX. Ein Büſchel kleiner Schwämme, und welche unten zuſammengewachſen ſind. Fig. IX. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwam̃. Fig. X. XI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.


Tab. XCVII.
Fig. I.
Fig. III.
Fig. II.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. IIX.
Fig. VII.
Fig. VI.
Fig. IX.
Fig. X.
Fig. XI.
St. Loibel pinx. Ratisb.
Anon sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS OCTOGESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus volua exceptus, bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo piloſo, primum conico, poſt campaniformi, denique plano; petiolo cylindraceo, ad baſin craſſiori; velo & annulo orbatus. In *Bauaria* nomen deſideratur.


Fig. I. Fungus intra voluam conicam, laceratam & ſquamoſam, latens.
Fig. II. Fungus intra voluam ouatam, coriaceam & ad baſin quaſi radicatam, adhuc occultus.
Fig. III. Fungus ex volua, parum diſrupta, adſcendere & ſe euoluere incipiens.
Fig. IV. Fungus euolutus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Fungus euolutus; pileo campaniformi, piloſo, ex dimidia parte ſuperiori volua adhaerente tecto.
Fig. VI. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. VII. IIX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der acht und neunzigſten Kupfertafel.

Der ſieben und achtzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, wenig abänderlicher, Eyſchwamm; mit einem haarigen, anfangs kegeligen, nachher glockigen, und endlich flachen, Hute; einem runden, unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in **Bayern** keinen Namen.

Fig. I. Ein in ſeinem kegeligen, zerriſſenen und ſchuppigen, Eye noch verſchloſſener Schwamm.
Fig. II. Ein noch in ſeinem länglichrunden, lederhaften, und unten gleichſam gewurzelten, Eye verborgener Schwamm.
Fig. III. Ein aus ſeinem geborſtenen Eye emporſteigender und ſich entwickelnder Schwamm.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem, haarigem, und an der obern Hälfte von dem hängengebliebenen Eye überdecktem, Hute.
Fig. VI. Eben dieſer Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VII. IIX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.



St. Loibel pinx. Rat. Trauttner sc. Norimb.

EXPLICATIO TABVLAE NONAGESIMAE NONAE.

AGARICVS OCTOGESIMVS OCTAVVS.

Est fungus bicolor vel tricolor, & solitarius & fasciculosus, carne destitutus, farctus, varius; pileo ab initio rotundiusculo, post campanulato, denique plano, ad oram plicato & plerumque exciso; petiolo gracili, cylindraceo & duro, recto vel tortili; velo & annulo orbatus. In *Bauaria* nomen quidem habet nullum, sed, quia digitis tritus, allium redolet, non iniuria *alliarius*, seu *Knoblauchschwamm*, dici queat.


Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano, ad oram exciso.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo plano, ad oram plicato.
Fig. III. Fungus paullulum euolutus; pileo campanulato.
Fig. IV. Trias fungorum explicatorum; pileis planis, ad oram integris; petiolis rectis.
Fig. V. Fungus explicatus; pileo plano, ad oram exciso & plicato.
Fig. VI. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.
Fig. VII. Fasciculus fungorum; pileis planis, flores aemulantibus.
Fig. IIX. Fungus explicatus, ad perpendiculum dissectus.
Fig. IX. X. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der neun und neunzigsten Kupfertafel.

Der acht und achtzigste Blätterschwamm.

Es ist solcher ein zweyfärbiger, oder dreyfärbiger, einzelner oder büscheliger, unfleischiger, voller und abänderlicher, Schwamm; mit einem anfangs rundlichen, nachher glockigen, endlich flachen, am Rande gefaltenen, und meist ausgeschnittenen, Hute; mit einem dünnen, runden und harten, geraden oder krummen, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat zwar in Bayern keinen Namen, könnte aber **Knoblauchschwamm** genennet werden, weil er, wenn er gerieben wird, nach Knoblauch riechet.

Fig. I. Ein entwickelter Schwam̃; mit flachem und am Rande ausgeschnittenem Hute. Fig. II. Ein entwickelter Schwam̃; mit flachem und am Rande gefaltenem Hute. Fig. III. Ein etwas entwickelter Schwam̃; mit glockigem Hute. Fig. IV. Drey entwickelte Schwämme; mit flachen Hüten, und geraden Stielen. Fig. V. Ein entwickelter Schwam̃; mit flachem, am Rande ausgeschnittenem und gefaltenem Hute. Fig. VI. Ein entwickelter Schwam̃, nach seiner Unterfläche. Fig. VII. Ein Büschel Schwämme; mit flachen und blumenähnlichen Hüten. Fig. IIX. Ein entwickelter und senkrecht zerschnittener Schwamm. Fig. IX. X. Der natürliche und vergrösserte Saamenstaub.


Tab. XCIX.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. X.
St. Loibel pinx. Ratisb.
G. P. Trauttner sc. Norimb.

AGARICVS OCTOGESIMVS NONVS.

Eſt fungus hydrophorus, bicolor, plerumque ſolitarius, fiſtuloſus, carne priuatus, valde varius; pileo ab initio ſquamulis tecto, cylindraceo vel conico, poſt campaniformi, denique plano, radiato, ad oram re-uoluto, integro vel inciſo; petiolo ad baſin craſſiori, recto vel curuato; velo ſpurio, ſed annulo nullo, praeditus. *Bauaris* eſt anonymus.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo, ſquamulis abſterſis, glandem querneam optime referente. Fig. II. Par fungorum nondum explica-torum; pileis conico cylindraceis, ſquamulis adhuc tectis. Fig. III. Fungus euolutus; pileo plano, a centro ad oram verſus radiato & reuoluto ſeu curuato. Fig. IV. Fungus paullulum explicatus; pileo campanulato & ſtriato. Fig. V. Fungus euolutus, ad perpendiculum diſſectus. Fig. VI. Fungus euolutus; pileo plano, a centro ad oram verſus radiato, reuoluto & inciſo. Fig. VII. Fungus explicatus; pileo ſingulariter reuoluto ſeu curuato. Fig. IIX. IX. Pollen na-tiuus & vitro auctus.

Erklärung der hundertſten Kupfertafel.

Der neun und achtzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, meiſtens einzelner, hohler, unfleiſchiger, ſehr abänderlicher, Waſſerſchwam̃; mit einem anfangs runden oder kegeligen, und mit kleinen Schuppen bedeckten, nachher glo-ckigen, und endlich flachen, am Rande aufgerollten, ganzen oder eingeſchnittenen, Hute; mit einem nach unten zu ſich verdicken-den, geraden oder gekrümmeten, Stiele; mit einer unächten Saa-mendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwam̃; mit einem eigelähnlichen Hute, und von dem die kleinen Schuppen abgewiſchet ſind. Fig. II. Ein Paar noch unentwi-ckelte Schwämme; mit kegelrunden, und von den kleinen Schuppen überdeckten, Hüten. Fig. III. Ein entwickelter Schwam̃; mit flachem, vom Mittelpunkte dem Rande zu geſtricheltem und aufgerolltem oder geſtülptem Hute. Fig. IV. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit glockigem und geſtricheltem Hute. Fig. V. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwam̃. Fig. VI. Ein entwickelter Schwam̃, mit flachem, von Mittelpunkte dem Rande zu geſtrahltem, aufgeſtülptem und eingeſchnittenem, Hute. Fig. VII. Ein entwickelter Schwam̃; mit einem ſonderbar aufgeſtülptem Hute. Fig. IIX. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Bayerische Staatsbibliothek München



St. Loibel pinx. Ratisb. G. P. Trauttner sc. Norimb.

SPHALMATA.

Tab. IV. lin. 10. p. *ſaſtigiato* l. *faſtigiato.* Tab. VII. lin. 15. p. *ſacies* l. *facies.* Tab. VIII. lin. 8. p. *ſurſim* l. *ſurſum.* lin. 14. p. *maxi.* l. *maxi-* Tab. XII. lin. 7. p. *pileo* l. *petiolo.* Tab. XVI. l. 13. p. *tinčto* l. *tinčta.* Tab. XVII. lin. 16. p. XIIII l. VIII. Tab. XXIV. lin. 5. 9. XXXI. lin. 5. 11. XXXII. lin. 5. XXXV. lin. 6. 16. XXXVI. lin. 5. L. lin. 13. pro *haemiſph.* l. *hemiſph.* Tab. XXXVIII. lin. 11. p. *explicatioins* l. *explicationis.* Tab. XLVI. lin. 1. p. *quatrageſimae* l. *quadrageſimae.* Tab. LXVIII. lin. 9. p. *ad perpendiculum: diſſečtus* l. *perpendiculum diſſečtus;.* Tab. LXXVII. lin. 6. p. *ten-* l. *te-* lin. 7. p. *uiori* l. *nuiori.* Tab. LXXXIV. adde *Fig.* IV. V. *Pollen natiuus & aučtus.*


Druckfehler.

Tab. XXIV. Zeile 12. vor entwickelter lieſs entwickelnder. Tab. XXX. Z. 10. v. ungeſtallte l. ungeſtalte. Tab. XLIII. Z. 6. v. nannten l. genannten. Z. 7. v. geſtimmten l. ſtimmten. Tab. XLV. Z. 14. v. kriegenden l. kriechenden. Tab. XLVI. Z. 10. v. und l. und ohne. Tab. LXXXIV. fehlet Fig. IV. V. der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

K. POSCHEGAR
Buchbinderei - Stempel
8031 PUCHHEIM
Augsburger Straße 33 1/3

SPHALMATA.

Tab. IV. lin. 10. p. *ſaſtigiato* l. *faſtigiato*. Tab. VII. lin. 15. p. *ſacies* l. *facies*. Tab. VIII. lin. 8. p. *ſurſim* l. *ſurſum*. lin. 14. p. *maxi*. l. *maxi-* Tab. XII. lin. 7. p. *pileo* l. *petiolo*. Tab. XVI. l. 13. p. *tincto* l. *tincta*. Tab. XVII. lin. 16. p. XIII l. VIII. Tab. XXIV. lin. 5. 9. XXXI. lin. 5. 11. XXXII. lin. 5. XXXV. lin. 6. 16. XXXVI. lin. 5. L. lin. 13. pro *haemiſph*. l. *hemiſph*. Tab. XXXVIII. lin. 11. p. *explicatioins* l. *explicationis*. Tab. XLVI. lin. 1. p. *quatrageſimae* l. *quadrageſimae*. Tab. LXVIII. lin. 9. p. *ad perpendiculum: diſſectus* l. *perpendiculum diſſectus;*. Tab. LXXVII. lin. 6. p. *ten-* l. *te-* lin. 7. p. *uiori* l. *nuiori*. Tab. LXXXIV. adde *Fig*. IV. V. *Pollen natiuus & auctus*.



BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Schaeffer, Jacob Christian

Iacobi Christiani Schaeffer Philosophiae Doct. Et Ecclesiae Evangelicae Ratisbon. ... Fvngorvm Qvi In Bavaria Et Palatinatv Circa Ratisbonam Nascvntvr Icones Nativis Coloribvs Expressae
Bd.: 1

Ratisbonae (1762)

Res/4 Bavar. 1617-1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00075413-6
VD18 11071230